



Linee guida per la diagnosi e il trattamento dell'infertilità

20
24

S.I.R.U.

SOCIETÀ ITALIANA DELLA RIPRODUZIONE UMANA

METHODOLOGY

Open Access



Diagnosis and management of infertility: NICE-adapted guidelines from the Italian Society of Human Reproduction

Stefano Palomba^{1,11*}, Paola Viganò², Sandrine Chamayou³, Zaira Donarelli⁴, Maria Paola Costantini⁵, Roberto Marci⁶, Paola Piomboni^{7,8}, Egidio Fino⁵, Luigi Montano⁹, Antonino Guglielmino³, Edgardo Somigliana^{2,10} and the SIRU Working Group on Italian Guideline for Infertility

Abstract

In Italy the fertility rate is very low, and an increasing number of patients are infertile and require treatments. The Italian Law concerning the safety of patient care, and the professional liability of health professionals, indicates that health professionals must comply with the recommendations set out in the guidelines developed by public and private bodies and institutions, as well as scientific societies and technical-scientific associations of the health professions, except for specific cases. Unfortunately, no guideline for the diagnosis and the management of infertility is currently available in Italy. In 2019, the Italian Society of Human Reproduction pointed out the need to produce Italian guidelines and subsequently approved the establishment of a multidisciplinary and multiprofessional working group (MMWG) to develop such a guideline. The MMWG was representative of 5 scientific societies, one national federation of professional orders, 3 citizens' and patients' associations, 5 professions (including lawyer, biologist, doctor, midwife, and psychologist), and 3 medical specialties (including medical genetics, obstetrics and gynecology, and urology). The MMWG chose to adapt a high-quality guideline to the Italian context instead of developing one from scratch. Using the Italian version of the Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation II scoring system, the National Institute of Clinical Excellence guidelines were selected and adapted to the Italian context. The document was improved upon by incorporating comments and suggestions where needed. This study presents the process of adaptation and discusses the pros and cons of the often-neglected choice of adapting rather than developing new guidelines.

Keywords ARTs, Guidelines, Infertility, IVF, Management, Sterility

*Correspondence:

Stefano Palomba
prof.stefano.palomba@gmail.com

¹ Department of Medical-Surgical Science and Translational Medicine, Sapienza University of Rome, Sant'Andrea Hospital, Rome, Italy

² Infertility Unit, Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milan, Italy

³ HERA Center, Unit of Reproductive Medicine (U.M.R.), Sant'Agata Li Battiati, Catania, Italy

⁴ Psychological Counselling Service, University of Palermo, Palermo, and Clinical Psychology Unit, ANDROS Day Surgery Clinic, Palermo, Italy

⁵ Italian Society of Human Reproduction, SIRU, Rome, Italy

⁶ Department of Translational Medicine, University of Ferrara, Ferrara, Italy

⁷ Department of Molecular and Developmental Medicine, University of Siena, Siena, Italy

⁸ Unit of Medically Assisted Reproduction, Siena University Hospital, Siena, Italy

⁹ Unit and Service of Lifestyle Medicine in Uro-Andrology, Local Health Authority of Salerno, Salerno, Italy

¹⁰ Department of Clinical Sciences and Community Health, University of Milan, Milan, Italy

¹¹ Unit of Gynecology, Sant'Andrea Hospital, Via di Grottarossa, 1039 Rome, Italy



© The Author(s) 2024. **Open Access** This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver (<http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>) applies to the data made available in this article, unless otherwise stated in a credit line to the data.

Introduction

The Italian Law (Law n. 24, 2017, 8th March) concerning the safety of care and of the patient, and the professional liability of health professionals indicates that health professionals must comply, except for specific cases, with the recommendations set out in the guidelines developed by public and private bodies and institutions as well as scientific societies and technical-scientific associations of the health professions. Regardless of the stakeholders involved in their development, these guidelines must be approved by the National Center for the Clinical Excellence, Quality and Safety of the Care (CNEC, *Centro Nazionale per l'Eccellenza Clinica, la Qualità e la Sicurezza delle Cure*), an institutional organism directly referring to the Ministry of Health. In 2017, this national organism published a methodological manual for guidelines development, a document that has recently been updated [1]. This process is complex and lengthy. To date, after more than 6 years, only 88 guidelines across the entire area of medicine have been approved (<https://www.iss.it/linee-guida1>).

In Italy, the fertility rate is very low, and an increasing number of patients are infertile and require treatments (https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2823_allegato.pdf). Due to the high incidence of infertility, mismanagement of this condition may have significant economic and epidemiological implications. Thus, the development and implementation of guidelines aim to ensure fairness, efficiency, and sustainability. Unfortunately, no CNEC-adopted guideline for the diagnosis and management of infertility is currently available in Italy. Recently, some papers have been published in this field [2, 3]. The first is an expert opinion aimed to summarize the risk factors for infertility and to identify a practical clinical and diagnostic approach for the male and female infertility [2]. The latter is a narrative review aimed to explore the indications, minimum access criteria, and outcomes of the assisted reproductive technologies (ARTs) for the male factor [3].

Based on these considerations, in 2019, the Italian Society of Human Reproduction (SIRU, *Società Italiana di Riproduzione Umana*) decided to submit a document to CNEC with a proposal of guidelines for the diagnosis and management of infertility to be adopted in Italy. This report aims to detail the methodological process followed and the results obtained.

Methods

Initially, the SIRU steering committee decided to focus on the primary objective of defining Italian guidelines for the diagnosis and management of couple infertility following the provisions of the National System Guidelines System (SNLG, *Sistema Nazionale Linee-Guida*),

an activity of CNEC exclusively dedicated to the development of guidelines. All the steps were carried out in accordance with the specific Manual of CNEC, with the latest version being accessible online. (<https://www.iss.it/documents/20126/7949265/Manuale+Metodologico+-+marzo+2023.pdf/01f4bc8e-f3e6-66ec-bbe1-e80186908c6c?t=1679921943422>)

First, the executive committee of SIRU spread and shared the idea to develop the guidelines among the members of the Society. A special fund was established to collect the necessary resources. This funding was exclusively open to personal contributions, whereas financial resources from commercial companies could not be accepted. In addition, SIRU itself participated to partially cover the expenditures. Overall, a total of €43,950 was collected and used for the process. The fund was mainly employed for a contract with a company specialized in public health activities and guidelines development. SIRU is a young Society, and the executive committee deemed it essential to be supported by a highly professional partner. For this purpose, the Italian Team for the Evidence-Based Medicine (GIMBE, *Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze* - <https://www.gimbe.org/>) was chosen for its undisputed reputation in this field in Italy.

A Multidisciplinary and Multiprofessional Working Group (MMWG) was subsequently defined according to principles of professional and specialist representation, as well as corporate. The MMWG was representative of 5 scientific societies and one national federation of professional orders, 3 citizens' and patients' associations, 5 professions (including lawyer, biologist, doctor, midwife, and psychologist), and 3 medical specialties (including medical genetics, obstetrics and gynecology, and urology).

Each component of the MMWG had to declare any potential conflict of interest before the first MMWG meeting. Having conflicts of interest was not an exclusion criterion from the MMWG, but they had to be transparent to the whole group and were handled in a case-by-case basis, depending on the specific item being evaluated.

The full identity of the MMWG' members will be made available upon reasonable request from the corresponding author. The MMWG strictly followed the different steps of the process of elaboration of the guideline through subgroups meetings (3 for each geographical macro-areas) followed by discussions during plenary meetings to achieve the consensus. These meetings were initially conducted in person but then shifted to teleconferences after the advent of the COVID-19 outbreak.

Based on the CNEC methodology, the MMWG initially chose to adapt an already available guideline of good methodological quality to the Italian context rather

than developing a new independent guideline. Several outstanding guidelines on the same topic were available in other countries, and it was deemed more efficient and sensible to adapt them to the Italian context. It was recognized that drafting new guidelines could be a very time-consuming procedure requiring a significant investment of economic and human resources, which were well beyond those available for the project.

The process of searching and selecting the reference guideline consisted of the following steps: 1. systematic search for available guidelines on infertility management; 2. quality assessment of the identified guidelines; and 3. selection of the best guidelines to use as reference.

To conduct the search, MMWG members screened articles and performed searches using key terms such as "infertility" or "sterility" matched with "guideline" on main websites, including PubMed, Web of Science, Google Scholar, Cochrane Library. All articles that referred to guidelines for the diagnosis and management of infertile couples were screened without language restriction. Additional journal articles were identified from references of the included documents. Full texts of eligible articles were evaluated, and only relevant papers were carefully assessed. The guidelines were then rated for quality using the Italian version [4] of the Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation II (AGREE II) scoring system [5, 6]. The guideline with the highest AGREE II score was chosen as the reference document. Subsequently, the MMWG adapted the reference document to the Italian context using the methodology for adapting the recommendations from international guidelines developed by the GIMBE Foundation (<https://www.gimbe.org/pagine/569/it/agree-ii>). In particular, the MMWG proceeded as follows: 1. deleted recommendations considered not relevant to the guideline aim (and reported the reason for each case) or inopportune in the country or considered debatable because of lack of valid local epidemiological information; 2. identified new issues potentially relevant for the Italian context and not assessed in the reference guideline; 3. evaluated the applicability of each specific recommendation, reporting any potential obstacle (scientific, structural, technological, organization, professional, regulatory, orographic, socio-cultural, or others) and 4. changed the original recommendations not applicable in Italy and indicated the reasons. All recommendations were analyzed according to the Italian legislation and availability of drugs. The presence of process facilitators was also discussed and analyzed.

New clinical issues could be developed if they were deemed to be uncovered by the selected guideline. The clinical issues were addressed according to the Population, Intervention, Comparison and Outcomes (PICO)

model [7]. Specifically, the "Population" comprised of infertile couples, the "Intervention" encompassed each strategy, procedure, or treatment employed to diagnose or treat infertility, the "Comparison" involved neither intervention nor placebo/sham arm or another potentially active intervention, and the "Outcomes" were ranked by importance in evaluating intervention effects case-by-case. Published systematic reviews and meta-analyses were used. No attempts were made to perform new independent systematic reviews.

A new extensive search of systematic reviews, with or without meta-analyses, was performed using the same websites mentioned above to update the referral guideline. Data published up to January 31, 2020, were collected, analyzed, interpreted, and integrated into the referral guideline. The MMWG established that these new questions and the updating process would not pertain to pre-implantation diagnosis of genetic or structural diseases. The complete methodological process followed the "GRADE-ADOLOPMENT" approach" based on the Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) Evidence to Decision (EtD) frameworks [8]. It was developed through plenary and sub-group meetings (3 for each geographical macro-areas). The subdivision of the activity by subgroup concerned only the screening of the systematic reviews identified. The other phases were carried out in a unified group. Any disagreements were resolved by consensus methods at the plenary meetings.

The SIRU guideline was subsequently subjected to a public consultation with the aim of collecting feedback on the preliminary version of the recommendations, as well as to evaluate their applicability and feasibility. This review was carried out through an online platform containing all the clinical recommendations. SIRU invited 241 stakeholders, including 2 bioethicists, 40 biologists, 127 physicians (endocrinologists, gynecologists, oncologists, urologists, immunologists), 6 midwives, 7 psychologists, 15 citizen and patient representatives, and 44 pharmaceutical and biomedical industry representatives. Each participant was asked to provide personal, professional, and contact data, and to list any changes performed to the clinical recommendations, indicating the related reasons, including possible obstacles to their application, and any added reference. The MMWG analyzed the proposed changes and integrated those deemed appropriate in the final recommendations.

After the public consultation, the document was submitted to an external review. The purpose of the external review was to improve the quality of the guidelines and to collect feedback on the draft version of the recommendations. The CNEC identified the Italian Society of Gynecology and Obstetrics (SIGO, *Società Italiana di*

Ginecologia e Ostetricia) as main external reviewer. Thus, the document was sent to the SIGO and was required to verify its content having as reference the Methodological Manual of the Guidelines developed by the CNEC. SIGO submitted the document to the members of its own Special Interest Group as well as other representative professional societies, including the Italian Society of Embryology, Reproduction and Research (SIERR, *Società Italiana di Embriologia, Riproduzione e Ricerca*), the Italian Society of Endocrinology (SIE, *Società Italiana di Endocrinologia*), the Italian Society of Andrology and Sexual Medicine (SIAMS, *Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità*), and the Luca Coscioni Association. The MMWG replied in a rebuttal letter addressing the suggestions and comments received, including those considered relevant in the final version of the document.

SIRU decided to update the guidelines every two years after publication, according to the updating of the original guideline. This process should aim to integrate new scientific evidence to support modifying pre-existing recommendations or to draft novel recommendations. The process should also aim to address any inconsistencies that may emerge from subsequent Italian guidelines prepared by other scientific societies or result from new legislation and case law developments.

Results

After evaluation of the available guidelines, the National Institute for Health and Care Excellence (NICE) guidelines resulted to have the highest AGREE II score and was selected as the guiding reference for this project. In particular, the last update of the NICE guidelines in

September 2017 was considered. The full details on the methodological aspects of the NICE guideline are available online on the following websites: www.nice.org.uk/guidance/cg156/evidence/full-guideline-pdf-188539453, www.nice.org.uk/guidance/cg156/evidence/appendices-a-o-pdf-188539454, www.nice.org.uk/guidance/cg156/evidence/appendix-h-pdf-188539455, www.nice.org.uk/guidance/cg156/evidence/appendix-m-pdf-188539456, and www.nice.org.uk/guidance/cg156/evidence/appendix-n-pdf-188539457.

Five original recommendations were deleted because considered unsuitable for inclusion. Specific reasons were as follows: absence of local epidemiological data (n. 3), drug not available (n. 1) and recommendation deemed redundant by the panel (n. 1). They are detailed in Table 1, together with reasons for being discarded.

Overall, for the process of adjournment, 829 systematic reviews were identified and screened. A total of 35 items were analyzed and included in the guideline. Specifically, 13 systematic reviews led to the modification of a recommendation [9–21], whereas other 22 systematic reviews were employed to develop new recommendations [22–43]. Other further documents were discussed and cited. They included three guidelines from the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) [44], American Society for Reproductive Medicine (ASRM) [45], and Italian Association of Medical Oncology (AIOM, *Associazione Italiana di Oncologia Medica*) (https://www.iss.it/documents/20126/8403839/LG296_Fertilit%C3%A0_PZ_Oncologici_agg2021.pdf/29e2ba98-a209-8805-cc0b-706f6c7ee2a5?version=1.0&t=1678805156827).

Table 1 The following NICE recommendations have been removed from the SIRU guidelines due to being deemed inappropriate with specific reasons

NICE CG156 – recommendation number	Delated recommendation	Reason
1.3.13.1.	Before undergoing uterine instrumentation, women should be offered screening for Chlamydia trachomatis using an appropriately sensitive technique.	Panel decision (unanimity). Data on Chlamydia trachomatis prevalence are not available in Italy. The adoption of this recommendation in the absence of local data would have contrasted with the local strong plea for limiting the use of antibiotics.
1.3.13.2.	If the result of a test for Chlamydia trachomatis is positive, women and their sexual partners should be referred for appropriate management with treatment and contact tracing.	
1.3.13.3.	Prophylactic antibiotics should be considered before uterine instrumentation if screening has not been carried out.	
1.5.2.9.	The effectiveness of pulsatile gonadotrophin-releasing hormone in women with clomifene citrate-resistant polycystic ovary syndrome is uncertain and is therefore not recommended outside a research context.	Panel decision (unanimity). Drug unavailable in Italy.
1.17.2.4.	Limit drugs used for controlled ovarian stimulation in IVF treatment to the lowest effective dose and duration of use.	Panel decision (unanimity). Deemed redundant, the concept was already included in the NICE recommendation 1.17.1.3. (17.1.3. for SIRU guidelines).

The modified recommendations as well as those newly developed, are presented in Tables 2 and 3, respectively, detailing the choices made in each case and the documents considered. Table 3 also includes studies [46, 47] discussed during the panel discussion and the public consultation (see below).

Twenty-five recommendations were modified for new evidence available (n. 11, including updated systematic reviews and available guidelines), and after panel decision (n. 14). Specifically, the panel decisions were mainly taken for issues conflicting with Italian legislation and regulations (Table 2). Finally, we introduced 17 new recommendations of which 15 were supported by novel evidence (including updated systematic reviews and available guidelines) and 2 were based on the panel opinion (Table 3).

The public consultation of the SIRU guideline was attended by 128 external reviewers, including 2 bioethicists, 28 biologists, 71 doctors (endocrinologists, gynecologists, oncologists, urologists, immunologists), 4 midwives, 3 psychologists, 8 representatives of citizens and patients and 12 representatives of pharmaceutical and biomedical industries. After revisions following the public consultation, the document underwent external review by 30 experts. The MMWG evaluated and assessed the comments received and prepared a comprehensive response. Comments and suggestions were categorized into 255 major points and a rebuttal letter was prepared in response. Any suggestions that were deemed relevant were included in the final version of the document.

For reference, the definitive specific recommendations are detailed in the [Supplementary file](#), reported in Italian to prevent potential inaccuracies in translation. Tables 1, 2 and 3 in the original NICE document detail all changes made, allowing readers to easily access the final English version of the document. The entire process took more than two years, beginning in May 2019 and concluding in August 2021 with submission to CNEC. Unfortunately, the document was rejected by CNEC one year later. The evaluation covered various quality parameters, including context of the scope, methodology, stakeholders' involvement, clarity in argumentation, and absence of interest. Applicability received the lowest score, but no specific reasons for this were provided.

Discussion

Clinical guidelines are thought to improve the quality-of-care patients receive. By summarizing evidence on a specific topic, guidelines make it easier for clinicians to make informed, evidence-based decisions for their patients in a timely manner. Guidelines not only promote

proven interventions but also discourage ineffective or potentially harmful ones. Additionally, guidelines can empower patients, influence public policy, improve the consistency of care, and drive the development of disease performance measures and evaluations [48]. Evidence-based guidelines are a crucial tool in assisting physicians, policymakers, and patients in every area of medicine, but they are especially important in the field of reproductive medicine. This is because infertility remains a significant challenge worldwide, as noted by the World Health Organization (<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infertility>). In many countries, access to and quality of interventions addressing infertility are limited. Unfortunately, the diagnosis and treatment of infertility are not always prioritized, and reproductive health strategies may not be covered by public health systems. Other issues related to infertility include the high cost of drugs and the lack of access to high-tech equipment. In Italy, ART procedures are not yet covered by the National Public Health system, although some regions do provide support. The availability of ART within the public health system varies greatly throughout the country, as local regions may choose to offer procedures if they are deemed sustainable by local governments. Despite an equitable distribution of funds to all regions, some provide full and unlimited support for ART (such as Lombardy), while others offer no support at all (such as Sicily). However, there are several private fertility centers throughout the country that offer high-quality care in fertility treatments. Thus, to mitigate inequities and disparities in access to fertility care, SIRU has developed guidelines with the patient as the primary focus. Two reasons prompted SIRU to establish these guidelines: (i) the implementation of Italian Law No. 24 in 2017, which regulated the development of guidelines by scientific societies, and the establishment of a system dedicated to their assessment and implementation (the CNEC); and (ii) the lack of clarity surrounding ART procedures due to the rules and limitations of Italian Law No. 40/2004, which governs medically assisted reproduction. The law has always been a focus of legal issues, particularly related to banned procedures. The positions of the Constitutional Court have mostly overturned the procedures forbidden by the Law, but pragmatical "grey" areas remain. Guidelines were developed to provide appropriate guidance on these aspects. Based on these factors, and considering the limited financial resources available, the panel of experts and representatives who composed the MMWG decided that adapting existing guidelines to the national context was the most appropriate approach. It was recognized that guidelines often take a significant amount of time to develop, and this decision was viewed as the most practical and efficient solution.

Table 2. NICE recommendations modified and included in the SIRU guidelines with specific reason.

NICE CG156 – recommendation number	SIRU guideline – recommendation number	Modified recommendation ^a	Reason
1.2.5.1.	2.5.1.	People who are concerned about their fertility should be informed that there is no consistent evidence of an association between consumption of caffeinated beverages (tea, coffee and colas) and fertility problems. <i>However, assumption of more than 2–3 cups of coffee (200–300 mg of caffeine) daily is associated with an increased risk of early pregnancy loss.</i>	Based on Lyngsø et al., 2017 [9]
3.10.1.	1.3.9.1.	People undergoing IVF treatment must undergo testing for HIV, hepatitis B, hepatitis C and syphilis.	Panel decision (unanimity). Based on the recommendations of the Italian Ministry of Health (DLGS 85/2012 e DPR 131/2019).
1.4.2.2.	4.2.2.	<i>Offer surgery for varicocele to improve the chance of natural conception in men with semen abnormalities, clinically remarkable varicocele, and a partner younger than 35 and a good ovarian reserve.</i>	Based on Kim et al., 2013 [10]
1.5.2.2.	5.2.2.	Offer women with WHO Group 2 anovulatory infertility 1 of the following treatments, taking into account potential adverse effects, ease and mode of use, the woman's BMI, and monitoring needed: • clomifene citrate or • metformin	Based on Sharpe et al., 2020 [11]
1.5.2.6.	5.2.6.	For women with WHO Group 2 ovulation disorders who are known to be resistant to clomifene citrate, consider one of the following second-line treatments, depending on clinical circumstances and the woman's preference: • laparoscopic ovarian drilling or • combined treatment with clomifene citrate and metformin or • gonadotrophins	Based on Bordewijk et al., 2020 [12]
1.8.1.3.	8.1.3.	Advise women with unexplained infertility who are having regular unprotected sexual intercourse to try to conceive for a total of 2 years (this can include up to one year before their fertility investigations) before IVF will be considered. <i>Consider a shorter period for women older than 35.</i>	Panel decision (no unanimity). Discrimination of women aged 40–42 was deemed unfair, complicated and in contrast with the national plea for facilitating motherhood to counteract the falling birth rate.
1.8.1.4.	8.1.4.	Offer IVF treatment to women with unexplained infertility who have not conceived after 2 years (this can include up to 1 year before their fertility investigations) of regular unprotected sexual intercourse. <i>Consider a shorter period for women older than 35.</i>	Panel decision (no unanimity). Discrimination of women aged 40–42 was deemed unfair, complicated and in contrast with the national plea for facilitating motherhood to counteract the falling birth rate.
1.9.1.3.	9.1.3.	For people with unexplained infertility, mild endometriosis or mild male factor infertility, who are having regular unprotected sexual intercourse: • do not routinely offer intrauterine insemination, either with or without ovarian stimulation (exceptional circumstances include, for example, when people have social, cultural or religious objections to IVF) • advise them to try to conceive for a total of 2 years (this can include up to 1 year before their fertility investigations) before IVF will be considered. <i>Consider a shorter period for women older than 35.</i>	Panel decision (no unanimity). Discrimination of women aged 40–42 was deemed unfair, complicated and in contrast with the national plea for facilitating motherhood to counteract the falling birth rate.
1.11.1.1.	11.1.1.	When considering IVF as a treatment option for people with fertility problems, discuss the risks and benefits of IVF	Panel decision (unanimity). HEFA code of practice is not used in Italy.

Table 2. (continued)

NICE CG156 – recommendation number	SIRU guideline – recommendation number	Modified recommendation ^a	Reason
1.11.1.3 and 1.1.1.1.4.	11.1.3.	In women aged < 43 years offer 3 full cycles of IVF, with or without ICSI. If the woman reaches the age of 43 years during treatment, complete the current full cycle but do not offer further full cycles. In women aged 40 to 42 years IVF, with or without ICSI, provided the following criteria are fulfilled: • there is no evidence of low ovarian reserve • there has been a discussion of the additional implications of IVF and pregnancy at this age.	Panel decision (no unanimity). Discrimination of women aged 40–42 was deemed unfair, complicated and in contrast with the national plea for facilitating motherhood to counteract the falling birth rate.
1.12.3.3.	12.5.5.	When using gonadotrophins for ovarian stimulation in IVF treatment: use an individualised starting dose of follicle-stimulating hormone, based on factors that predict success, such as: - age - BMI - presence of polycystic ovaries - ovarian reserve Do not use a dosage of follicle-stimulating hormone of more than 300 IU/day	Based on Lensen et al., 2018 [13]
1.12.3.7.	12.3.7.	Do not use growth hormone as adjuvant treatment in IVF protocols.	Based on Liu et al., 2018 [14]
1.12.5.2.	12.5.2.	For the safe practice of administering sedative drugs refer to <i>local Italian Guidelines</i>	Panel decision (unanimity). No specific reference is reported because these guidelines are under development
1.12.5.3.	12.5.3.	Women should not be offered follicle flushing because this procedure does not increase the numbers of oocytes retrieved or pregnancy rates, and it increases the duration of oocyte retrieval and associated pain.	Based on Georgiou et al., 2018 [15]
1.12.5.5.	12.5.5.	Assisted hatching in <i>fresh embryos</i> is not recommended because it has not been shown to improve pregnancy rates. <i>Evidence for frozen embryos is yet inconclusive.</i>	Based on Zeng et al., 2018 [16]
1.12.6.4.	12.6.4.	Evaluate embryo quality, at both cleavage and blastocyst stages, according to ESHRE recommendation	Based on ESHRE Special Interest Group, 2017 [44]
1.12.7.3.	12.7.3.	Inform women undergoing IVF treatment that the evidence does not support continuing any form of treatment for luteal phase support beyond 5 weeks' gestation.	Based on Watters et al., 2020 [17]
1.13.1.1.	13.1.1.	The recognised indications for treatment by intracytoplasmic sperm injection (ICSI) include: severe deficits in semen quality, obstructive azoospermia, non-obstructive azoospermia and the use of frozen eggs. In addition, treatment by ICSI should be considered for couples in whom a previous IVF treatment cycle has resulted in failed or very poor fertilisation.	Panel decision (unanimity). Based on Italian legislation and regulations.
1.15.2.1.	15.2.1.	<i>Oocytes donation programs should adhere to the according to the Italian legislation and regulations (D. Lgs. 16/2010, D. Lgs. 85/2012 and DPR 131/2019).</i>	Panel decision (unanimity). Based on Italian legislation and regulations.

Table 2. (continued)

NICE CG156 – recommendation number	SIRU guideline – recommendation number	Modified recommendation ^a	Reason
1.16.1.1.	16.1.1.	When considering and using cryopreservation for people before starting chemotherapy or radiotherapy, that is likely to affect their fertility, follow recommendations of the SNLG.	Based on AIOM guidelines. Available at: https://www.iss.it/documents/20126/8403839/LG296_Fertilit%C3%A0_PZ_Oncologic_Lagg2021.pdf/29e2ba98-a209-8805-cc0b-706f6c7ee2a5?version=1.0&t=1678805156827 National guideline on fertility preservation available on the website of the Ministry of Health).
1.16.1.7.	16.1.8.	When using cryopreservation to preserve fertility in people diagnosed with cancer, use sperm or oocytes or ovarian cortex.	Panel decision (unanimity). Embryos cannot be stored in a fertility preservation context based on the Italian Legislation (Law n. 40/2004).
1.16.1.12 and 1.16.1.13.	16.1.14	Include in the informed consent the duration of freezing and the modalities to renovate the cryopreservation.	Panel decision (unanimity). Unclear Italian legislation. Risks of litigations if a rigid threshold of duration is given.
1.17.2.3.	17.2.4.	Inform people who are considering IVF treatment that <i>newborns have a modest increase in the risk of malformations. It has not yet been clarified whether the risk is related to the procedure or whether it is related to the condition of infertility.</i>	Based on Liang et al., 2017, Hoorsan et al., 2017, Chen et al., 2018, and Gior-gione et al., 2018 [18–21]

^a The changes/modifications are reported in *italics* when added and as text when deleted

Table 3 New recommendations included in the SIRU guidelines with specific reason

SIRU guideline – recommendation number	New recommendation	Reason
2.10.1.	Exposure to mercury may interfere with female and male fertility. Attention should be given to professional and dietary exposure to mercury.	Based on Henriques et al., 2019 [22]
2.14.	Inform women who had a previous cesarean section that they should wait for at least 10 months after the intervention prior to initiate pregnancy seeking to reduce the risk of uterine rupture.	Based on Matorras et al., 2019 [23]
3.3.1.	Despite some evidence on the association between HPV infection and female and male infertility, there is no indication to investigate its presence because the infection does not modify the subsequent fertility work-up.	Based on Weinberg et al., 2020 [24] and Yuan et al., 2020 [25]
3.9.3.	Diagnosis of proximal tubal block does not impact on the success of intrauterine insemination. These women should receive the same management as those with bilateral patency. Conversely, the diagnosis of distal block halves the chance of success.	Based on Tan et al., 2019 [26]
4.2.3.	Offer surgery for varicocele to infertile men with an indication to IVF, including men with non-obstructive azoospermia.	Based on Esteves et al., 2016 [27] and Kirby et al., 2016 [28]
10.5.4.	Inform women scheduled for IVF that a regular physical exercise in the period preceding the attempt can increase the success of the procedure.	Based on Rao et al., 2018 [29]
11.1.4.1	In good prognosis women (such as young women who had a prior clinical pregnancy for IVF), consider continuing beyond the limit of three full IVF cycles. This decision should be carefully evaluated and justified taking into utmost consideration the balance between risks and benefits.	Panel decision (unanimity). Recommendation long debated within the panel [46]
12.3.8.	Consider prescribing myo-inositol prior to IVF because it can reduce the total dose of administered gonadotropins.	Based on Zheng et al., 2017 [30] and Laganà et al., 2018 [31]
12.4.2.	Consider trigger with GnRH agonists in women at risk of ovarian hyperstimulation syndrome.	Based on Mizrachi et al., 2020 [32]
12.4.5.	Consider dopamine agonists to prevent ovarian hyperstimulation syndrome in women at risk.	Based on Tang et al., 2016 [33]
12.6.10.	Inform women that single embryo transfer does not fully protect from twin pregnancy. IVF pregnancies are at 2–3-time higher risk of monozygotic twins.	Based on Hviid et al., 2018 [34] and Busnelli et al., 2019 [35]
12.6.11.	Inform women that IVF is associated with a higher risk of placental anomalies (placenta praevia, placental abruption and abnormal cord insertion).	Based on Vermey et al., 2019 [36]
12.6.14.	Inform women on the possibility to perform preimplantation genetic screening for aneuploidies but clarify that it cannot increase the chance of pregnancy.	Decision panel (no unanimity). Based on Lee et al., 2015 [37], and Cornelisse et al., 2020 [38]. Recommendation long debated within the panel [47]
15.3.4.	Women undergoing oocytes donation should be informed about the increased obstetrics risks, including preterm birth, hypertensive disorders and low weight newborns. The counseling should be tailored to the specific condition of the woman.	Based on Jeve et al., 2016 [39], Masoudian et al., 2016 [40] and Mascarenhas et al., 2017 [41]
16.1.4.	Consider the provision of information with written material and audio-visual media because they actively involve and empower the patients and can improve fertility preservation decision-making.	Based on Wang et al., 2019 [42]
16.1.12	Offer ovarian cortex freezing in prepubertal or young girls who are preparing for medical treatment for cancer that is likely to make them infertile if: <ul style="list-style-type: none"> • they are well enough to undergo surgery • this will not worsen their condition and • enough time is available before the start of their cancer treatment. 	Based on ASRM [45] and AIOM guidelines (see before).
17.2.3.	Even if rare, inform people who are considering IVF treatment with or without ICSI that newborns are at increased risk of imprinting disorders.	Based on Cortessis et al., 2018 [43]

This paper provides a detailed account of the process involved in adapting the NICE guidelines entitled "Fertility: assessment and treatment for people with fertility problems" to the Italian context. Although less demanding than developing a new guideline, the process was lengthy and required significant resources, which were unfortunately further prolonged by the COVID-19 outbreak, leading to intense debates among the involved parties. The process involved up to 200 individuals and resulted in the deletion of five recommendations, update of 25 recommendations, and development of 17 new recommendations. The final document consisted of 217 recommendations, mostly overlapping with the original NICE guidelines but updated and adapted to the Italian context.

Unfortunately, to date, the guideline implementation has not been possible, and we have yet to assess its applicability and overall impact. In May 2022, the CNEC provided a negative evaluation of the document, without providing the opportunity for revision, which is not in compliance with the normal process outlined in their manual. The main concern raised was the limited applicability of the document. The decision was surprising since the MMWG had provided an adaptation of a guideline used in UK for several years (with the last version dating back to 2013) with no recent adjustments required. In addition, the changes made by the MMWG to the NICE guidelines affected only a minority of recommendations and were not critical. On the other hand, the negative assessment of CNEC in relation to SIRU guidelines has faced criticism at the societal level for the decision to adapt guidelines instead of developing new ones. Choosing the NICE guidelines as the reference document was likely not the problem. In other words, the negative evaluation may not have been dependent on which guidelines the MMWG had chosen to use. A recent review published in *Heart* [49] described the principles and processes of clinical guideline development at NICE. Notably, NICE recommendations consider both the clinical effectiveness and the cost-effectiveness of interventions [49]. The guidelines are developed by an independent panel of healthcare professionals supported by a team that includes project managers, information specialists, systematic reviewers, and health economists. Moreover, NICE selects a limited number of high-impact questions to answer through the review of evidence, rather than exhaustively covering a particular topic. These factors alone can ensure the quality of the development process [49].

On the other hand, we must acknowledge that the decision made by CNEC was in response to challenges posed by the Italian healthcare system. ART procedures are only covered at certain infertility centers in specific

regions, making it difficult to apply the SIRU guidelines across the entire country. Therefore, it is understandable that CNEC had to adapt the guidelines to fit the unique Italian context. Since broad applicability is crucial for CNEC-endorsed guidelines, their decision is partly understandable. While SIRU guidelines may be useful for regions covering ART, they may not be relevant for regions that do not. However, it is worth noting that the government recently recognized ART as a supported treatment, and all regions are now mandated to provide it to citizens starting from January 1st, 2024. With this in mind, we remain optimistic that the evaluation of SIRU guidelines' limited applicability will be reassessed in due course.

Another possible explanation for CNEC's decision could be related to the significant legal disparities in how infertility issues are regulated in Italy and the UK. While Court rulings may have addressed some of the limitations of Italian Law 40, it remains in effect. The CNEC may have viewed this aspect as a strong barrier to the applicability of the NICE guidelines as the legislation regulating ART in the UK does not ban procedures that are prohibited under the Italian law.

Regardless of the reasons behind the rejection of the SIRU guidelines, we have chosen to publish our efforts as a model for others. Additionally, we advocate for greater use of the adaptive approach to guidelines in the future, as this approach permits the use of updated, tailored, and high-quality guidelines without significant economic or human resource investments. Adopting the adaptive approach to guidelines could be a highly appealing option for low- and medium-income countries. However, a careful evaluation of the pros and cons of adopting versus developing novel guidelines should be conducted before embarking on a challenging endeavor, such as the one presented herein. Infertility care may be particularly critical in this regard, given the disparities in accesses, governmental policy interest, and legislation on this topic across different countries. Finally, since no official guidelines for infertility currently exist in Italy, these adapted guidelines – based on the NICE ones – will serve as the formal clinical guidelines of SIRU until new guidelines are released.

Abbreviations

AGREE II	Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation II
AIOM	Italian Association of Medical Oncology
ARTs	assisted reproductive technologies
ASRM	American Society of Reproductive Medicine
CNEC	National Center for the Clinical Excellence, Quality and Safety of the Care
EtD	Evidence to Decision
GIMBE	Italian Team for the Evidence-Based Medicine
GRADE	Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation

ICSI	intracytoplasmic sperm injection
IVF	in vitro fertilization
MMWG	Multidisciplinary and Multiprofessional Working Group
NICE	National Institute of Clinical Excellence
PDTA	Diagnostic-Therapeutic-Care Pathways
PICO	Population, Intervention, Comparison and Outcomes
SIRU	Italian Society of Human Reproduction
SNLG	National System Guidelines System

Supplementary Information

The online version contains supplementary material available at <https://doi.org/10.1186/s12958-023-01179-2>.

Additional file 1: Supplementary document. Linee guida per la diagnosi e il trattamento dell'infertilità. NICE-adapted guidelines of the SIRU in Italian version.

Acknowledgements

The authors would like to express their gratitude to all the external reviewers for their constructive criticism and improvement of the final document. SIRU Working Group on Italian Guideline for Infertility Nicola Arrighi¹, Anna Biallo², Luca Boeri³, Sandrine Chamayou⁴, Antonella Cinotti⁵, Elisabetta Coccia⁶, Maria Paola Costantini⁷, Giacomo D'Amico⁸, Cinzia Di Matteo⁹, Zaira Donarelli¹⁰, Vincenzo Favilla¹¹, Guglielmino Antonino⁴, Maria Giulia Minasi¹², Luigi Montano¹³, Stefano Palomba¹⁴, Veronica Ricciuto¹⁵, Marco Sbracia¹⁶, Edgardo Somigliana¹⁷, Francesca Spinella¹⁹, Paola Viganò²⁰, Maria Vitale²¹, Giulia Eleonora Carmela Zinno²².
¹Unit of Urology, "Città di Brescia" Clinical Institute, Brescia, Italy; ²L'Altra Cicogna Onlus, Bari, Italy; ³Urology, Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milan, Italy; ⁴HERA Center, Unit of Reproductive Medicine (U.M.R.), Sant'Agata Li Battiati, Catania, Italy; ⁵Obstetrics, University of Florence, Florence, Italy; ⁶Unit of Obstetrics and Gynecology, University of Florence, Florence, Italy; ⁷Law firm for Health Law, Rome, Italy; ⁸University of Messina, and HERA ONLUS Association, Messina, Italy; ⁹Obstetrics, Local Health Authority of Lanciano-Vasto, Chieti, Italy; ¹⁰Psychological Counselling Service, University of Palermo, Palermo, and Clinical Psychology Unit, ANDROS Day Surgery Clinic, Palermo, Italy; ¹¹Unit of Urology, "P. Borsellino" Hospital, Marsala-Trapani, Italy; ¹²European Hospital, Rome, Italy; ¹³Andrology Unit and Service of Lifestyle Medicine in Uro-Andrology, Local Health Authority of Salerno, Salerno, Italy; ¹⁴Department of Medical-Surgical Science and Translational Medicine, Sapienza University of Rome, Sant'Andrea Hospital, Rome, Italy; ¹⁵Faculty of Medicine and Surgery, Saint Camillus International University of Health Sciences – UniCamillus, Rome, Italy; ¹⁶Reproductive Medicine, Center of Assisted Reproduction "Hungaria", Rome, Italy; ¹⁷Infertility Unit, Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore, Milan, and Department of Clinical Sciences and Community Health, University of Milan, Milan, Italy; ¹⁹GENOMA Group, Rome, Italy; ²⁰Infertility Unit, Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore, Milan, Italy; ²¹Cittadinanzattiva Association, Rome, Italy; ²²Reproductive Medicine, Local Health Authority of Naples, Naples, Italy.

Authors' contributions

S.P., P.V., L.M., A.G., and E.S. conceptualized and designed the study. S.P., P.V., and E.S. drafted the article. All authors (S.P., P.V., S.C., Z.D., M.P.C., R.M., P.P., E.F., L.M., A.G., E.S.) interpreted the data, critically revised the article, provided their final approval of the version to be published, and agreed to be accountable for all aspects of the work, especially regarding its accuracy and integrity.

Authors' information

S.P., P.V., L.M., A.G., and E.S. conceptualized and designed the study. S.P., P.V., and E.S. drafted the article. All authors (S.P., P.V., S.C., Z.D., M.P.C., R.M., P.P., E.F., L.M., A.G., E.S.) interpreted the data, critically revised the article, provided their final approval of the version to be published, and agreed to be accountable for all aspects of the work, especially regarding its accuracy and integrity.

Funding

The preparation of the current guidelines was funded by "National Ethical Fund for Guidelines" which is dedicated to promoting and developing guidelines, and it is sponsored by SIRU. SIRU partially covered the expenses

to produce the document, providing approximately €30,000.00, while the remaining €20,000.00 was obtained through spontaneous donations from individual citizens or Infertility Centers. Additionally, SIRU covered the scientific and organizational consultancy costs of the GIMBE institute. It should be noted that the content of the guidelines has not been influenced by the individuals or organizations that financed its production.

Availability of data and materials

The datasets used and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author on reasonable request.

Declarations

Ethics approval and consent to participate

Not applicable.

Consent for publication

Not applicable.

Competing interests

P.V. declares that she received an honorarium speaker from Merck-Serono, that her Institution received research support funding from Theramex, and that she is Section Editor of Reproductive Biology and Endocrinology. S.C., Z.D. and A.G. declare that their Institution supported travel and accommodation expenses for the meetings related to this project. A.G. declares that he received an honorarium speaker from Ferring which he has fully donated to the Guidelines Fund. M.P.C. declared that on March 8th, 2017, at the request of the 12th Hygiene and Health Commission of the Senate, she participated in the hearing on the bills 1630 and subsequent relating to medically assisted reproduction (amendment of law 40/2004). E.S. declares that he received fees from Human Reproduction (years 2012–2018), Human Reproduction Open (year 2019–2021), Merck-Serono (year 2018), and Theramex (year 2018); and his Institution received research support funding from Ferring (years 2016–2020), Theramex (year 2019).

All other Authors declare that they have no competing interests.

Received: 24 September 2023 Accepted: 23 December 2023

First published online: 15 January 2024

References

- Coclite D, Napoletano A, Fauci AJ, Graziano G, Iannone P. Manuale metodologico per la produzione di linee guida di pratica clinica. 2017. Adjourned form available at: <https://www.iss.it/documents/20126/7949265/Manuale+Metodologico+-+marzo+2023.pdf/01f4bc8e-f3e6-66ec-bbe1-e80186908c6c?t=1679921943422>.
- Garolla A, Pizzol D, Carosso AR, Borini A, Ubaldi FM, Calogero AE, Ferlin A, Lanzone A, Tomei F, Engl B, Rienzi L, De Santis L, Cotichio G, Smith L, Cannarella R, Anastasi A, Menegazzo M, Stuppia L, Corsini C, Foresta C. Practical clinical and diagnostic pathway for the investigation of the infertile couple. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2021;11:591837.
- Mazzilli R, Rucci C, Vaiarelli A, Cimadomo D, Ubaldi FM, Foresta C, Ferlin A. Male factor infertility and assisted reproductive technologies: indications, minimum access criteria and outcomes. *J Endocrinol Invest*. 2023;46:1079–85.
- Cartabellotta A. AGREE II: come valutare la qualità delle linee-guida [AGREE II: assessing the quality of practice guidelines]. *Recenti Prog Med*. 2011;102:217–9.
- Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, Fervers B, Graham I, Grimshaw J, Hanna SE. The global rating scale complements the AGREE II in advancing the quality of practice guidelines. *J Clin Epidemiol*. 2012;65:526–34.
- Brouwers MC, Kerkvliet K, Spithoff K. The AGREE Reporting Checklist: a tool to improve reporting of clinical practice guidelines. *BMJ*. 2016;352:i1152.
- Frandsen TF, Bruun Nielsen MF, Lindhardt CL, Eriksen MB. Using the full PICO model as a search tool for systematic reviews resulted in lower recall for some PICO elements. *J Clin Epidemiol*. 2020;127:69–75.

8. Schünemann HJ, Wiercioch W, Brozek J, Etkeandia-Ikobaltzeta I, Mustafa RA, Manja V, Brignardello-Petersen R, Neumann I, Falavigna M, Alhazzani W, Santesso N, Zhang Y, Meerpohl JJ, Morgan RL, Rochwerf B, Darzi A, Rojas MX, Carrasco-Labra A, Adi Y, AlRayees Z, Riva J, Bollig C, Moore A, Yepes-Núñez JJ, Cuello C, Waziry R, Akl EA. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks for adoption, adaptation, and de novo development of trustworthy recommendations: GRADE-ADOLOPMENT. *J Clin Epidemiol*. 2017;81:101–10.
9. Lyngsø J, Ramlau-Hansen CH, Bay B, Ingerslev HJ, Hulman A, Kesmodel US. Association between coffee or caffeine consumption and fecundity and fertility: a systematic review and dose-response meta-analysis. *Clin Epidemiol*. 2017;9:699–719.
10. Kim KH, Lee JY, Kang DH, Lee H, Seo JT, Cho KS. Impact of surgical varicocele repair on pregnancy rate in subfertile men with clinical varicocele and impaired semen quality: a meta-analysis of randomized clinical trials. *Korean J Urol*. 2013;54:703–9.
11. Sharpe A, Morley LC, Tang T, Norman RJ, Balen AH. Metformin for ovulation induction (excluding gonadotrophins) in women with polycystic ovary syndrome. *Cochrane Database Syst Rev*. 2019;12:CD013505.
12. Bordewijk EM, Ng KYB, Rakic L, Mol BWJ, Brown J, Crawford TJ, van Wely M. Laparoscopic ovarian drilling for ovulation induction in women with anovulatory polycystic ovary syndrome. *Cochrane Database Syst Rev*. 2020;2:CD001122.
13. Lensen SF, Wilkinson J, Leijdekkers JA, La Marca A, Mol BWJ, Marjoribanks J, Torrance H, Broekmans FJ. Individualised gonadotropin dose selection using markers of ovarian reserve for women undergoing in vitro fertilisation plus intracytoplasmic sperm injection (IVF/ICSI). *Cochrane Database Syst Rev*. 2018;2:CD012693.
14. Liu Y, Hu L, Fan L, Wang F. Efficacy of dehydroepiandrosterone (DHEA) supplementation for in vitro fertilization and embryo transfer cycles: a systematic review and meta-analysis. *Gynecol Endocrinol*. 2018;34:178–83.
15. Georgiou EX, Melo P, Brown J, Granne IE. Follicular flushing during oocyte retrieval in assisted reproductive techniques. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018;4:CD004634.
16. Zeng M, Su S, Li L. The effect of laser-assisted hatching on pregnancy outcomes of cryopreserved-thawed embryo transfer: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Lasers Med Sci*. 2018;33:655–66.
17. Watters M, Noble M, Child T, Nelson S. Short versus extended progesterone supplementation for luteal phase support in fresh IVF cycles: a systematic review and meta-analysis. *Reprod Biomed Online*. 2020;40:143–50.
18. Liang Y, Chen L, Yu H, Wang H, Li Q, Yu R, Qin J. Which type of congenital malformations is significantly increased in singleton pregnancies following after in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection: a systematic review and meta-analysis. *Oncotarget*. 2017;9:4267–78.
19. Hoorsan H, Mirmiran P, Chaichian S, Moradi Y, Hoorsan R, Jesmi F. Congenital malformations in infants of mothers undergoing assisted reproductive technologies: a systematic review and meta-analysis study. *J Prev Med Public Health*. 2017;50:347–60.
20. Chen L, Yang T, Zheng Z, Yu H, Wang H, Qin J. Birth prevalence of congenital malformations in singleton pregnancies resulting from in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection worldwide: a systematic review and meta-analysis. *Arch Gynecol Obstet*. 2018;297:1115–30.
21. Giorgione V, Parazzini F, Fesslova V, Cipriani S, Candiani M, Inversetti A, Sigismondi C, Tiberio F, Cavoretto P. Congenital heart defects in IVF/ICSI pregnancy: systematic review and meta-analysis. *Ultrasound Obstet Gynecol*. 2018;51:33–42.
22. Henriques MC, Loureiro S, Fardilha M, Herdeiro MT. Exposure to mercury and human reproductive health: a systematic review. *Reprod Toxicol*. 2019;85:93–103.
23. Matorras R, Berreteaga L, Lainz L, Exposito A, Martínez L. Influence of Caesarean section-pregnancy interval on uterine rupture risk and IVF pregnancy rates: systematic review and mathematical modelling. *Reprod Biomed Online*. 2019;39:809–18.
24. Weinberg M, Sar-Shalom Nahshon C, Feferkorn I, Bornstein J. Evaluation of human papilloma virus in semen as a risk factor for low sperm quality and poor in vitro fertilization outcomes: a systematic review and meta-analysis. *Fertil Steril*. 2020;113:955–69.
25. Yuan S, Qiu Y, Xu Y, Wang H. Human papillomavirus infection and female infertility: a systematic review and meta-analysis. *Reprod Biomed Online*. 2020;40:229–37.
26. Tang H, Mourad S, Zhai SD, Hart RJ. Dopamine agonists for preventing ovarian hyperstimulation syndrome. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016;11:CD008605.
27. Esteves SC, Miyaoka R, Roque M, Agarwal A. Outcome of varicocele repair in men with nonobstructive azoospermia: systematic review and meta-analysis. *Asian J Androl*. 2016;18:246–53.
28. Kirby EW, Wiener LE, Rajanahally S, Crowell K, Coward RM. Undergoing varicocele repair before assisted reproduction improves pregnancy rate and live birth rate in azoospermic and oligospermic men with a varicocele: a systematic review and meta-analysis. *Fertil Steril*. 2016;106:1338–43.
29. Rao M, Zeng Z, Tang L. Maternal physical activity before IVF/ICSI cycles improves clinical pregnancy rate and live birth rate: a systematic review and meta-analysis. *Reprod Biol Endocrinol*. 2018;16:11.
30. Zheng X, Lin D, Zhang Y, Lin Y, Song J, Li S, Sun Y. Inositol supplement improves clinical pregnancy rate in infertile women undergoing ovulation induction for ICSI or IVF-ET. *Medicine (Baltimore)*. 2017;96:e8842.
31. Laganà AS, Vitagliano A, Noventa M, Ambrosini G, D'Anna R. Myo-inositol supplementation reduces the amount of gonadotropins and length of ovarian stimulation in women undergoing IVF: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Arch Gynecol Obstet*. 2018;298:675–84.
32. Mizrachi Y, Horowitz E, Farhi J, Raziel A, Weissman A. Ovarian stimulation for freeze-all IVF cycles: a systematic review. *Hum Reprod Update*. 2020;26:118–35.
33. Tan J, Tannus S, Taskin O, Kan A, Albert AY, Bedaiwy MA. The effect of unilateral tubal block diagnosed by hysterosalpingogram on clinical pregnancy rate in intrauterine insemination cycles: systematic review and meta-analysis. *BJOG*. 2019;126:227–35.
34. Hviid KVR, Malchau SS, Pinborg A, Nielsen HS. Determinants of monozygotic twinning in ART: a systematic review and a meta-analysis. *Hum Reprod Update*. 2018;24:468–83.
35. Busnelli A, Dallagiovanna C, Reschini M, Paffoni A, Fedele L, Somigliana E. Risk factors for monozygotic twinning after in vitro fertilization: a systematic review and meta-analysis. *Fertil Steril*. 2019;111:302–17.
36. Vermey BG, Buchanan A, Chambers GM, Kolibianakis EM, Bosdou J, Chapman MG, Venetis CA. Are singleton pregnancies after assisted reproduction technology (ART) associated with a higher risk of placental anomalies compared with non-ART singleton pregnancies? A systematic review and meta-analysis. *BJOG*. 2019;126:209–18.
37. Lee E, Illingworth P, Wilton L, Chambers GM. The clinical effectiveness of preimplantation genetic diagnosis for aneuploidy in all 24 chromosomes (PGD-A): systematic review. *Hum Reprod*. 2015;30:473–83.
38. Cornelisse S, Zagers M, Kostova E, Fleischer K, van Wely M, Mastenbroek S. Preimplantation genetic testing for aneuploidies (abnormal number of chromosomes) in in vitro fertilisation. *Cochrane Database Syst Rev*. 2020;9:CD005291.
39. Jevé YB, Potdar N, Opoku A, Khare M. Donor oocyte conception and pregnancy complications: a systematic review and meta-analysis. *BJOG*. 2016;123:1471–80.
40. Masoudian P, Nasr A, de Nanassy J, Fung-Kee-Fung K, Bainbridge SA, El Demellawy D. Oocyte donation pregnancies and the risk of preeclampsia or gestational hypertension: a systematic review and metaanalysis. *Am J Obstet Gynecol*. 2016;214:328–39.
41. Mascarenhas M, Sunkara SK, Antonisamy B, Kamath MS. Higher risk of preterm birth and low birth weight following oocyte donation: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2017;218:60–7.
42. Wang Y, Anazodo A, Logan S. Systematic review of fertility preservation patient decision aids for cancer patients. *Psychooncology*. 2019;28:459–67.
43. Cortessis VK, Azadian M, Buxbaum J, Sanogo F, Song AY, Sriprasert I, Wei PC, Yu J, Chung K, Siegmund KD. Comprehensive meta-analysis reveals association between multiple imprinting disorders and conception by assisted reproductive technology. *J Assist Reprod Genet*. 2018;35:943–52.
44. ESHRE Special Interest Group of Embryology and Alpha Scientists in Reproductive Medicine. The Vienna consensus: report of an expert meeting on the development of ART laboratory performance indicators. *Reprod Biomed Online*. 2017;35:494–510.

45. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Fertility preservation in patients undergoing gonadotoxic therapy or gonadectomy: a committee opinion. *Fertil Steril*. 2019;112:1022–33.
46. Cameron NJ, Bhattacharya S, Bhattacharya S, McLernon DJ. Cumulative live birth rates following miscarriage in an initial complete cycle of IVF: a retrospective cohort study of 112 549 women. *Hum Reprod*. 2017;32:2287–97.
47. Munné S, Kaplan B, Frattarelli JL, Child T, Nakhuda G, Shamma FN, Silverberg K, Kalista T, Handyside AH, Katz-Jaffe M, Wells D, Gordon T, Stock-Myer S, Willman S, STAR Study Group. Preimplantation genetic testing for aneuploidy versus morphology as selection criteria for single frozen-thawed embryo transfer in good-prognosis patients: a multicenter randomized clinical trial. *Fertil Steril*. 2019;112:1071–9.
48. Guerra-Farfan E, Garcia-Sanchez Y, Jornet-Gibert M, Nuñez JH, Balaguer-Castro M, Madden K. Clinical practice guidelines: The good, the bad, and the ugly. *Injury*. 2023;54:S26–9.
49. Garbi M. National Institute for Health and Care Excellence clinical guidelines development principles and processes. *Heart*. 2021;107:949–53.

Publisher's Note

Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Ready to submit your research? Choose BMC and benefit from:

- fast, convenient online submission
- thorough peer review by experienced researchers in your field
- rapid publication on acceptance
- support for research data, including large and complex data types
- gold Open Access which fosters wider collaboration and increased citations
- maximum visibility for your research: over 100M website views per year

At BMC, research is always in progress.

Learn more biomedcentral.com/submissions





Linee guida per la diagnosi e il trattamento dell'infertilità

RACCOMANDAZIONI CLINICHE

1. Princìpi di cura

1.1. Fornire informazioni

1.1.1. Fornire le consulenze per problemi di fertilità a entrambi i partner perché le decisioni diagnostiche e terapeutiche riguardano la coppia.

1.1.2. Dare alle persone l'opportunità di prendere decisioni in merito all'assistenza e ai trattamenti attraverso l'accesso a informazioni basate sulle evidenze e sulla legislazione in materia. L'informazione deve essere considerata parte integrante del processo decisionale e avvalersi di documenti scritti o in formato audiovisivo.

1.1.3. Fornire le informazioni sulle opzioni terapeutico-assistenziali in una forma accessibile anche a persone con necessità particolari come, ad esempio, soggetti con disabilità fisiche o sensoriali o con ridotte capacità cognitive o linguistiche.

1.2. Effetti psicologici dei problemi di fertilità

1.2.1. Nelle coppie con problemi di fertilità, informare entrambi i partner che lo stress dell'uomo e/o della donna può influenzare la relazione di coppia e, riducendo il desiderio sessuale e la frequenza dei rapporti sessuali, può anche contribuire ai problemi di fertilità.

1.2.2. Informare le persone con problemi di fertilità che può essere di aiuto rivolgersi ad associazioni di pazienti e/o a partecipare a gruppi di sostegno specifici.

1.2.3. Proporre alle persone con problemi di fertilità una consulenza psicologica poiché tali problemi, le indagini diagnostiche e i trattamenti potrebbero causare stress psicologico.

1.2.4. Proporre la consulenza psicologica prima, durante e dopo il processo diagnostico e terapeutico indipendentemente dai risultati di queste procedure.

1.2.5. La consulenza psicologica dovrebbe essere erogata da uno psicologo che non abbia un'influenza diretta sulla gestione clinica assistenziale della persona e/o della coppia con problemi di fertilità.

1.3. Assistenza primaria e specialistica

1.3.1. Le persone con problemi di fertilità dovrebbero essere prese in carico da un team multiprofessionale e multidisciplinare per migliorare l'efficacia e l'efficienza del trattamento nonché il grado di soddisfazione.

2. Consulenza iniziale alle coppie preoccupate per un ritardo nel concepimento

2.1. Probabilità di concepimento

2.1.1. Informare le persone preoccupate per la loro fertilità che oltre l'80% delle coppie nella popolazione generale riesce a concepire entro un anno se:

- La donna ha meno di 40 anni.
- Non utilizzano metodi contraccettivi e hanno rapporti sessuali regolari (ogni 2 o 3 giorni).

Circa la metà delle coppie che non concepisce nel primo anno lo fa nel secondo anno (tasso di gravidanza cumulativo superiore al 90%).

2.1.2. Informare le persone che si stanno sottoponendo a cicli di inseminazione intrauterina (IUI) secondo le indicazioni riportate alla raccomandazione 9.1.1 (problematiche sessuologiche, infettivologiche o donazione di seme) che:

- più del 50% delle donne di età <40 anni concepiscono entro 6 cicli di IUI.
- di quelle che non concepiscono dopo 6 cicli di IUI, circa il 50% lo fa entro ulteriori 6 cicli (tasso di gravidanza cumulativo superiore al 75%).

2.1.3. Informare le persone che si stanno sottoponendo a cicli di IUI che l'utilizzo di liquido seminale fresco è associato a tassi di concepimento più alti rispetto all'utilizzo di liquido seminale crioconservato. Inoltre, informarle che la IUI è associata a tassi di concepimento maggiori rispetto all'inseminazione intracervicale.

2.1.4. Informare le persone preoccupate per la loro fertilità che la fertilità femminile si riduce con l'avanzare dell'età, in particolare dopo i 35 anni. Anche la fertilità maschile si riduce con l'età, seppur in misura minore.

2.1.5. Spiegare e discutere le probabilità di concepimento con le persone preoccupate per la loro fertilità utilizzando la tabella 1 per le coppie che hanno rapporti sessuali e la tabella 2 per quelle che ricorrono alle IUI per le indicazioni riportate alla raccomandazione 9.1.1 (problematiche sessuologiche, infettivologiche o donazione di seme).

Età della donna (anni)	Gravidanza entro un anno	Gravidanza entro due anni
19–26	92%	98%
27–29	87%	95%
30–34	86%	94%
35–39	82%	90%

Tabella 1. Tassi cumulativi di gravidanza in funzione del numero di cicli mestruali (un anno è equivalente a 12 cicli)
(Dunson et al., 2004)¹¹

¹ Dunson DB, Baird DD, Colombo B. Increased infertility with age in men and women. *Obstet Gynecol.* 2004 Jan;103(1):51-6.

Età della donna (anni)	IUI con seme congelato	
	6 cicli	12 cicli
<35	63%	86%
35–39	50%	75%

Tabella 2. Tassi cumulativi di gravidanza in funzione del numero di inseminazioni con seme congelato (dati HFEA - <https://www.hfea.gov.uk/>)

2.2. Frequenza e tempistica dei rapporti sessuali o dell'inseminazione intrauterina (IUI)

2.2.1. Informare le persone preoccupate per la loro fertilità che avere rapporti sessuali vaginali completi ogni 2 o 3 giorni ottimizza le probabilità di concepire.

2.2.2. Per le persone che si stanno sottoponendo a inseminazione intrauterina, l'inseminazione deve essere programmata nel periodo dell'ovulazione.

2.3. Alcol

2.3.1. Raccomandare alle donne alla ricerca di una gravidanza di non bere più di 1 o 2 unità² di alcol 1 o 2 volte/settimana. Informarle inoltre che gli episodi di intossicazione alcolica in gravidanza possono danneggiare il feto.

2.3.2. Informare gli uomini che un consumo di alcol inferiore a 3 o 4 unità/die non dovrebbe avere effetti importanti sulla qualità del liquido seminale.

2.3.3. Informare gli uomini che un eccessivo consumo di alcol danneggia la qualità del liquido seminale.

2.4. Fumo

2.4.1. Informare le donne che fumare riduce la fertilità.

2.4.2. Indirizzare le donne fumatrici a servizi o centri anti-fumo.

2.4.3. Informare le donne che il fumo passivo influisce sulle probabilità di concepire.

2.4.4. Informare gli uomini fumatori dell'associazione tra fumo e riduzione della qualità del liquido seminale, e che smettere di fumare migliorerà il loro stato di salute generale.

2.5. Assunzione di caffeina

2.5.1. Informare le persone preoccupate per la loro fertilità che non esistono robuste evidenze di associazione tra consumo di bevande contenenti caffeina (caffè, tè, cola) e problemi di fertilità. L'assunzione di più di 2-3 tazze di caffè (200-300 mg di caffeina) al giorno sembra tuttavia associarsi ad aumentato rischio di aborto spontaneo. [Aggiornata 2020]³

² Per unità di alcol si intende: 1 bicchiere (125 ml) di vino di media gradazione, o 1 lattina di birra (330 ml) di media gradazione, o 1 bicchierino (40 ml) di superalcolico.

³ Lyngsø J, Ramlau-Hansen CH, Bay B, Ingerslev HJ, Hulman A, Kesmodel US. Association between coffee or caffeine consumption and fecundity and fertility: a systematic review and dose-response meta-analysis. Clin Epidemiol. 2017 Dec 15;9:699-719.

2.6. Obesità

2.6.1. Informare le donne con BMI (indice di massa corporea) ≥ 30 che probabilmente impiegheranno più tempo per concepire e che si espongono ad aumentati rischi ostetrici.

2.6.2. Informare le donne con BMI ≥ 30 e anovulazione che il dimagrimento aumenta le probabilità di concepimento.

2.6.3. Informare le donne che partecipare a programmi che prevedano sia consigli nutrizionali che attività fisica moderata aumenta le probabilità di gravidanza rispetto al solo dimagrimento.

2.6.4. Informare gli uomini con BMI ≥ 30 che potrebbero avere problemi di fertilità.

2.7. Basso peso corporeo

2.7.1. Informare le donne con BMI < 19 e che hanno cicli mestruali irregolari/assenti che un incremento del peso corporeo aumenta le probabilità di concepimento. In presenza di franchi disturbi del comportamento alimentare, considerare un approccio multidisciplinare.

2.8. Biancheria intima aderente

2.8.1. Informare gli uomini che un'elevata temperatura scrotale si associa ad una ridotta qualità del liquido seminale. Tuttavia, non ci sono chiare evidenze che indossare biancheria intima non aderente migliori la fertilità.

2.9. Attività professionale

2.9.1. Alcuni lavori comportano esposizioni a condizioni di rischio che possono ridurre la fertilità maschile o femminile. Occorre indagare l'attività professionale delle persone preoccupate per la loro fertilità e fornire loro le opportune indicazioni.

2.10. Esposizione al mercurio

2.10.1. Il mercurio e gli inquinanti associati possono interferire con la fertilità maschile e femminile. Particolare rilievo deve essere dato alle esposizioni al mercurio sia in termini di attività professionale che di abitudini alimentari. [Nuova 2020]⁴

2.11. Utilizzo di farmaci prescritti, da banco e di droghe ricreative

2.11.1. L'uso di diversi farmaci e sostanze stupefacenti interferisce con la fertilità maschile e femminile. Chiedere alle persone preoccupate per la loro fertilità se ne fanno uso e, in caso affermativo, fornire loro le opportune indicazioni.

⁴ Henriques MC, Loureiro S, Fardilha M, Herdeiro MT. Exposure to mercury and human reproductive health: A systematic review. Reprod Toxicol. 2019 Apr;85:93-103.

2.12. Terapie complementari

2.12.1. Informare le persone preoccupate per la loro fertilità che non vi sono sufficienti evidenze sull'efficacia delle terapie complementari per problemi di fertilità.

2.13. Acido folico

2.13.1. Informare le donne che cercano una gravidanza che una supplementazione di acido folico prima del concepimento e fino alla 12^{ma} settimana di gestazione riduce il rischio di difetti del tubo neurale nel bambino. La dose raccomandata è 0.4 mg/die. Raccomandare alle donne che hanno precedentemente avuto un bambino con un difetto del tubo neurale o in terapia con farmaci anti-epilettici o diabetiche una dose di 5 mg/die.

2.14. Pregressi tagli cesarei

2.14.1. Informare le donne che hanno avuto un precedente parto mediante taglio cesareo che, al fine di ridurre il rischio di rottura d'utero, sarebbe opportuno aspettare almeno 10 mesi dal parto precedente prima di ricominciare la ricerca di prole. [Nuova 2020]⁵

2.15. Definire l'infertilità

2.15.1. Fornire una valutazione iniziale alle persone preoccupate a causa del ritardo del concepimento. Indagare in particolare lo stile di vita e le abitudini sessuali al fine di identificare i soggetti con minori probabilità di concepire.

2.15.2. Fornire alle coppie che non riescono ad avere rapporti sessuali o che hanno difficoltà ad averli una specifica consulenza per discutere le possibili soluzioni.

2.15.3. Il contesto in cui viene svolta la consulenza per problemi di fertilità dovrebbe consentire alle persone di discutere questioni delicate come, ad esempio, l'abuso sessuale, il maltrattamento e la violenza.

2.15.4. L'infertilità deve essere definita come una durata temporale di ricerca di gravidanza senza successo, durata che deve essere adattata alle specifiche caratteristiche della coppia. Considerare accertamenti e trattamenti solo dopo la fine di tale periodo.

2.15.5. In caso di mancato concepimento dopo un anno di rapporti sessuali vaginali non protetti, in assenza di cause note di infertilità, sottoporre le donne in età riproduttiva e i loro partner a valutazioni

⁵ Matorras R, Berreteaga L, Laínz L, Exposito A, Martínez L. Influence of Caesarean section-pregnancy interval on uterine rupture risk and IVF pregnancy rates: systematic review and mathematical modelling. Reprod Biomed Online. 2019 Nov;39(5):809-818.

cliniche ed accertamenti.

2.15.6. La donna senza fattori di rischio per infertilità e che sta eseguendo un programma di inseminazioni intrauterine per problematiche sessuologiche, infettivologiche o con seme di donatore dovrebbe sottoporsi a ulteriori valutazioni cliniche e diagnostiche dopo 6 cicli con esito negativo. Nel caso venga utilizzato liquido seminale del partner, le indagini cliniche e diagnostiche più approfondite dovrebbero essere estese anche a quest'ultimo.

2.15.7. Anticipare la consulenza specialistica nei seguenti casi:

- donne di età >35 anni.
- presenza di una causa nota di infertilità o di fattori predisponenti ad una condizione di infertilità.

2.15.8. Fornire una consulenza specialistica tempestiva ai pazienti che devono sottoporsi a trattamenti che riducono la fertilità (es. terapie oncologiche).

2.15.9. Indirizzare i pazienti preoccupati per la loro fertilità con infezioni croniche (epatite B, epatite C, HIV) a centri con servizi ed esperienza adeguati per fornire indagini e trattamenti che riducano i rischi.

3. Diagnosi di infertilità e strategie terapeutiche

3.1. Esame seminale

3.1.1. L'esame del liquido seminale è parte della valutazione iniziale. I risultati devono riferirsi agli standard di riferimento emanati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità:

- volume ≥ 1.5 ml.
- pH ≥ 7.2 .
- concentrazione spermatozoi ≥ 15 milioni/ml.
- numero totale spermatozoi ≥ 39 milioni/eiaculato.
- motilità totale (percentuale della motilità progressiva e non-progressiva) $\geq 40\%$ oppure motilità progressiva $\geq 32\%$.
- vitalità $\geq 58\%$.
- morfologia spermatozoi (percentuale di forme normali) $\geq 4\%$.

3.1.2. Non effettuare lo screening per gli anticorpi anti-spermatozoi perché non ci sono evidenze di un trattamento efficace per migliorare la fertilità.

3.1.3. Se i risultati del primo esame del liquido seminale non rientrano nei valori di riferimento, ripetere l'esame.

3.1.4. L'esame seminale di controllo deve essere svolto 3 mesi dopo il primo test per garantire un ciclo completo di spermatogenesi. In caso di deficit severo (azoospermia o grave oligozoospermia), ripetere

l'esame di conferma il prima possibile.

3.2. Test post-coitale del muco cervicale

3.2.1. Non effettuare il test post-coitale del muco cervicale per valutare le coppie con problemi di fertilità perché non ha valore predittivo sulla probabilità di gravidanza.

3.3. Infezione da Papillomavirus (HPV)

3.3.1. Anche se esistono evidenze per una associazione tra HPV e infertilità maschile e femminile, non vi è un'indicazione a eseguire di routine questo test in quanto, sulla base delle evidenze oggi disponibili, l'eventuale positività al test non modifica il percorso terapeutico delle coppie. [Nuova 2020]^{6,7}

3.4. Test di riserva ovarica

3.4.1. Considerare l'età della donna come fattore predittivo di concepimento spontaneo.

3.4.2. Considerare l'età della donna come fattore predittivo di successo della fecondazione *in vitro* (Figura 1).

⁶ Yuan S, Qiu Y, Xu Y, Wang H. Human papillomavirus infection and female infertility: a systematic review and meta-analysis. *Reprod Biomed Online*. 2020 Feb;40(2):229-237.

⁷ Weinberg M, Sar-Shalom Nahshon C, Feferkorn I, Bornstein J. Evaluation of human papilloma virus in semen as a risk factor for low sperm quality and poor in vitro fertilization outcomes: a systematic review and meta-analysis. *Fertil Steril*. 2020 May;113(5):955-969.e4.




Figura 1: Distribuzione delle probabilità di gravidanza cumulative (e relativi intervalli di confidenza al 95%) per ciclo iniziato con ovociti propri per classe di età (Dati Registro PMA – 2017). Disponibile a:

http://old.iss.it/binary/rpma/cont/C_17_pubblicazioni_2866_allegato.pdf

3.4.3. Come fattore predittivo della risposta ovarica alla stimolazione con gonadotropine durante la fecondazione *in vitro* utilizzare una delle seguenti valutazioni:

- conta dei follicoli antrali (AFC) totale ≤ 4 per predire una scarsa risposta e ≥ 16 per una risposta elevata.
- ormone anti-Mülleriano (AMH) ≤ 5.4 pmol/l (0.75 ng/ml) per predire una scarsa risposta e ≥ 25 pmol/l (3.5 ng/ml) per una risposta elevata.

Nei casi di sospetta grave compromissione della riserva ovarica, valutare come completamento delle indagini il dosaggio dell'ormone follicolo-stimolante (FSH) e dell'estradiolo (E2) in fase follicolare precoce.

3.4.4. Non utilizzare singolarmente nessuno dei seguenti test per predire l'esito di un trattamento per la fertilità:

- volume ovarico.
- flusso sanguigno ovarico.
- inibina B.
- estradiolo (E2).

3.5. Regolarità dei cicli mestruali

3.5.1. Nelle donne preoccupate per la loro fertilità indagare la frequenza e la regolarità dei cicli mestruali. Informare le donne con cicli mestruali regolari che i loro cicli sono verosimilmente ovulatori.

3.5.2. Alle donne che si stanno sottoponendo ad indagini per l'infertilità richiedere il dosaggio serico di progesterone in fase medio-luteale del ciclo (il 21° giorno di un ciclo di 28 giorni) per confermare l'avvenuta ovulazione anche in presenza di cicli mestruali regolari.

3.5.3. Alle donne con cicli mestruali di durata superiore a 28 giorni richiedere il dosaggio serico di progesterone. In base alla lunghezza dei cicli mestruali, questo test potrebbe dover essere effettuato più tardivamente (per esempio il 28° giorno di un ciclo di 35 giorni) e ripetuto una volta a settimana fino all'inizio del ciclo mestruale successivo.

3.5.4. L'uso delle curve della temperatura corporea basale per confermare l'ovulazione non è raccomandato in quanto non affidabile.

3.5.5. Alle donne con cicli mestruali irregolari prescrivere il dosaggio serico di FSH e ormone luteinizzante (LH) in fase follicolare precoce.

3.6. Dosaggio della prolattina

3.6.1. Alle donne preoccupate per la loro fertilità non prescrivere il dosaggio serico della prolattina. Prescrivere questo test esclusivamente a donne con anovulatorietà, galattorrea o tumore ipofisario.

3.7. Test di funzionalità tiroidea

3.7.1. Considerato che le donne con problemi di fertilità non sono maggiormente soggette a patologie tiroidee rispetto alla popolazione generale, non prescrivere di routine i test di funzionalità tiroidea.

3.8. Biopsia endometriale

3.8.1. Non effettuare la biopsia endometriale e esame istologico per valutare la fase luteale perché non ci sono evidenze che un trattamento medico dei difetti della fase luteale aumenti le probabilità di gravidanza.

3.9. Valutazione delle anomalie tubariche e uterine

3.9.1. Nelle donne senza comorbidità note (es. malattia infiammatoria pelvica, pregressa gravidanza ectopica o endometriosi) effettuare l'isterosalpingografia (HSG) per valutare la pervietà tubarica. È un test affidabile per escludere un'occlusione tubarica ed è meno invasivo e più costo-efficace rispetto alla laparoscopia. In Centri con adeguata competenza, la valutazione ecografica della pervietà tubarica

(isterosonosalpingografia) può essere considerata una valida alternativa alla HSG.

3.9.2. Eseguire la laparoscopia con salpingocromoscopia solo nelle donne con sospette comorbidità per valutare contemporaneamente la patologia tubarica e la presenza di altre patologie pelviche.

3.9.3. Il riscontro di impervietà tubarica monolaterale prossimale non ha un impatto sulla probabilità di successo delle IUI. Le pazienti in questa situazione devono essere considerate alla stregua delle pazienti con pervietà bilaterale. Al contrario, il riscontro di un'occlusione distale si associa ad un dimezzamento delle probabilità di successo. [Nuova 2020]⁸

3.9.4. L'isteroscopia di routine non fa parte degli esami per la valutazione iniziale della donna.

3.10. Test microbiologici

3.10.1. Alle persone che si sottopongono a trattamenti fecondazione *in vitro* prescrivere i test per Sifilide, HIV, epatite B ed epatite C come da indicazioni in materia DLGS 16/2010 e successive integrazioni (compreso DLGS 85/2012 e DPR 131/2019) (per le inseminazioni da donatore cfr. *raccomandazione 4.3.1*).

3.10.2. Alle persone con infezione da HIV, epatite B o epatite C fornire una consulenza specialistica specifica e un appropriato trattamento clinico dell'infezione.

3.11. Trasmissione virale

3.11.1. Per le coppie in cui l'uomo è affetto da infezione da HIV, per le decisioni sulla gestione della fertilità coinvolgere nella discussione la coppia, uno specialista in fertilità e un infettivologo esperto in HIV.

3.11.2. Informare le coppie in cui l'uomo è affetto da infezione da HIV che il rischio di trasmissione del virus HIV alla donna tramite i rapporti sessuali non protetti è trascurabile quando vengono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- l'uomo assume regolarmente la terapia antiretrovirale altamente attiva (HAART)
- l'uomo ha una carica virale plasmatica <50 copie/ml da oltre 6 mesi
- non sono presenti altre infezioni genitali
- i rapporti non protetti sono limitati al periodo dell'ovulazione.

3.11.3. Informare le coppie che, se sono soddisfatti tutti i criteri della *raccomandazione 3.11.2*, il trattamento per la riduzione della carica virale sul liquido seminale non riduce ulteriormente il rischio di infezione ma può diminuire la probabilità di gravidanza.

⁸ Tan J, Tannus S, Taskin O, Kan A, Albert AY, Bedaiwy MA. The effect of unilateral tubal block diagnosed by hysterosalpingogram on clinical pregnancy rate in intrauterine insemination cycles: systematic review and meta-analysis. BJOG. 2019 Jan;126(2):227-235.

3.11.4. Nelle coppie in cui l'uomo è affetto da infezione da HIV e non assume regolarmente la HAART o la sua carica virale plasmatica è >50 copie/ml, eseguire il trattamento per la riduzione della carica virale sul liquido seminale.

3.11.5. Informare le coppie che il trattamento per la riduzione della carica virale del liquido seminale riduce, ma non elimina, il rischio di trasmissione di HIV.

3.11.6. Per le coppie che soddisfano tutti i criteri della *raccomandazione 3.11.2* ma percepiscono come inaccettabile il rischio di trasmissione del virus anche dopo discussione con lo specialista in HIV, considerare il trattamento per la riduzione della carica virale del liquido seminale.

3.11.7. Informare le coppie che non ci sono sufficienti evidenze per raccomandare alle donne HIV-negative di effettuare la profilassi pre-esposizione, quando sono soddisfatti tutti i criteri della *raccomandazione 3.11.2*.

3.11.8. Eseguire la vaccinazione prima di iniziare i trattamenti per l'infertilità nei partner di soggetti con epatite B.

3.11.9. Non effettuare il trattamento per la riduzione della carica virale del liquido seminale come parte di un trattamento per l'infertilità a uomini affetti da epatite B.

3.11.10. Per le coppie in cui l'uomo è affetto da infezione da epatite C, per le decisioni sulla gestione dell'infertilità, coinvolgere nella discussione la coppia, uno specialista in fertilità, e uno esperto in epatite C.

3.11.11. Informare le coppie che vogliono concepire e nelle quali l'uomo è affetto da epatite C che il rischio di trasmissione attraverso rapporti sessuali non protetti è basso.

3.11.12. Per gli uomini con epatite C discutere con uno specialista le opzioni terapeutiche per eradicare la malattia prima di considerare il concepimento.

3.12. Recettività alla rosolia

3.12.1. Alle donne preoccupate per la loro fertilità prescrivere il test per valutare la recettività alla rosolia al fine di identificare quelle da sottoporre a vaccinazione. Sottoporre a vaccinazione le donne recettive alla rosolia informandole che il concepimento è sconsigliato per almeno 1 mese dopo la vaccinazione.

3.13. Screening per il carcinoma della cervice

3.13.1. Per evitare ritardi nei trattamenti dell'infertilità, alle donne preoccupate per la loro fertilità chiedere la data e il risultato del più recente test di screening per carcinoma della cervice uterina. Effettuare lo screening in conformità a quanto previsto dai servizi sanitari regionali.

4. Trattamento medico e chirurgico dell'infertilità maschile

4.1. Trattamento medico

4.1.1. Trattare i pazienti affetti da ipogonadismo ipogonadotropo con gonadotropine perché si sono dimostrate efficaci nel migliorare la fertilità.

4.1.2. Nei pazienti con anomalie del liquido seminale da causa inspiegata e livelli bassi di FSH periferico, non prescrivere anti-estrogeni, androgeni, bromocriptina o farmaci che aumentano i livelli di chinina perché non sono efficaci. L'impiego delle gonadotropine potrebbe migliorare la qualità del liquido seminale ma le evidenze sono insufficienti per consigliarne l'uso sistematico.

4.1.3. Informare i pazienti che il significato clinico della positività ad anticorpi anti-spermatozoi è incerto così come l'uso dei corticosteroidi sistemici come terapia.

4.1.4. Non prescrivere ai pazienti con riscontro di leucospermia una terapia antibiotica se non in presenza di un'accertata infezione, dal momento che non esistono evidenze che questo aumenti la probabilità di gravidanza.

4.2. Trattamento chirurgico

4.2.1. La correzione chirurgica dell'azoospermia dovuta a ostruzione epididimale dovrebbe essere proposta in Centri con adeguata competenza dal momento che questo intervento è potenzialmente in grado di rendere pervio il dotto e aumentare la fertilità. Considerare la correzione chirurgica come una valida alternativa al recupero chirurgico degli spermatozoi e alle successive tecniche di fecondazione *in vitro*.

4.2.2. Considerare il trattamento chirurgico del varicocele per incrementare le probabilità di concepimento naturale in uomini infertili con alterazioni del liquido seminale, varicocele clinico e partner di età inferiore a 35 anni e con buona riserva ovarica. [Aggiornata 2020]⁹

4.2.3. Considerare il trattamento chirurgico per varicocele clinico nei casi di infertilità maschile con indicazione a fecondazione *in vitro*, ivi compresi i casi di azoospermia non ostruttiva. [Nuova 2020]^{10,11}

4.3. Trattamento del difetto di eiaculazione

4.3.1. Il trattamento dei problemi di eiaculazione può ripristinare la fertilità senza dover ricorrere a metodi invasivi per il recupero degli spermatozoi o tecniche di fecondazione assistita. Tuttavia, sono necessarie ulteriori studi per meglio valutare le opzioni terapeutiche disponibili.

⁹ Kim KH, Lee JY, Kang DH, Lee H, Seo JT, Cho KS. Impact of surgical varicocele repair on pregnancy rate in subfertile men with clinical varicocele and impaired semen quality: a meta-analysis of randomized clinical trials. Korean J Urol. 2013 Oct;54(10):703-9.

¹⁰ Kirby EW, Wiener LE, Rajanahally S, Crowell K, Coward RM. Undergoing varicocele repair before assisted reproduction improves pregnancy rate and live birth rate in azoospermic and oligospermic men with a varicocele: a systematic review and meta-analysis. Fertil Steril. 2016 Nov;106(6):1338-1343.

¹¹ Esteves SC, Miyaoka R, Roque M, Agarwal A. Outcome of varicocele repair in men with nonobstructive azoospermia: systematic review and meta-analysis. Asian J Androl. 2016 Mar-Apr;18(2):246-53.

5. Disturbi dell'ovulazione

Classificazione dei disturbi dell'ovulazione

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) classifica i disturbi dell'ovulazione in tre gruppi:

- Gruppo I: insufficienza ipotalamo-ipofisaria (amenorrea ipotalamica o ipogonadismo ipogonadotropo).
- Gruppo II: disfunzione ipotalamo-ipofisi-ovarica (prevalentemente sindrome dell'ovaio policistico).
- Gruppo III: insufficienza ovarica.

5.1. Disturbi dell'ovulazione del Gruppo I

5.1.1. Al fine di incrementare le probabilità di ovulazione, concepimento e normale gravidanza consigliare alle pazienti con disturbo ovulatorio del Gruppo I:

- aumento del peso corporeo in caso di BMI <19 e/o
- riduzione dell'esercizio fisico se si stanno sottoponendo a esercizio fisico intenso.

5.1.2. Prescrivere alle pazienti con disturbo ovulatorio del Gruppo I la somministrazione di gonadotropine con attività LH per indurre l'ovulazione.

5.2. Disturbi dell'ovulazione del Gruppo II

Nelle pazienti con disturbo ovulatorio del Gruppo II sottoposte a trattamenti di prima linea per la stimolazione ovarica:

5.2.1. Consigliare la perdita di peso alle pazienti con BMI ≥ 30 (cfr. *raccomandazione 2.6*). Informarle del fatto che la sola riduzione del peso può ripristinare l'ovulazione, migliorare la risposta all'induzione dell'ovulazione e influenzare positivamente gli outcome della gravidanza.

5.2.2. Prescrivere uno dei seguenti trattamenti, tenendo in considerazione potenziali effetti avversi, facilità e modalità d'uso, BMI e necessità di monitoraggio:

- Clomifene citrato o
- Metformina (solo off-label) [Aggiornata 2020]¹²

5.2.3. Sottoporre le pazienti in terapia con clomifene citrato ad un monitoraggio ecografico, almeno al primo ciclo di trattamento, per verificare che stiano assumendo una dose tale da minimizzare il rischio di gravidanza multipla.

5.2.4. Per le pazienti in terapia con clomifene citrato, non protrarre il trattamento oltre i 6 mesi.

5.2.5. Informare le pazienti in terapia con metformina degli effetti collaterali associati al suo uso

¹² Sharpe A, Morley LC, Tang T, Norman RJ, Balen AH. Metformin for ovulation induction (excluding gonadotrophins) in women with polycystic ovary syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Dec 17;12(12):CD013505.

(nausea, vomito e altri disturbi gastrointestinali).

Nelle pazienti con disturbo ovulatorio del Gruppo II resistenti al trattamento con clomifene citrato:

5.2.6. Considerare uno dei seguenti trattamenti di seconda linea, tenendo conto delle caratteristiche cliniche delle pazienti e delle loro preferenze:

- Trattamento combinato con clomifene citrato e metformina.
- Gonadotropine. [Aggiornata 2020]¹³

5.2.7. Non prescrivere alle pazienti con sindrome dell'ovaio policistico in terapia con gonadotropine una terapia concomitante con GnRH agonisti, dal momento che non aumenta la probabilità di gravidanza ma aumenta il rischio di sindrome da iperstimolazione ovarica.

5.2.8. L'impiego adiuvante di ormone della crescita (GH) in corso di stimolazione dell'ovulazione non è raccomandato perché non aumenta la probabilità di gravidanza.

5.3. Amenorrea iperprolattinemica – dopamino agonisti

5.3.1. Alle pazienti con disturbi ovulatori causati da iperprolattinemia prescrivere un trattamento con dopamino-agonisti. Nella scelta del farmaco considerare la sicurezza del suo uso in gravidanza e la minimizzazione dei costi.

5.4. Monitoraggio dell'induzione dell'ovulazione durante la terapia con gonadotropine

5.4.1. Prima dell'inizio del trattamento, informare le pazienti a cui viene prescritta la terapia con gonadotropine dei rischi di gravidanza multipla e di sindrome da iperstimolazione ovarica.

5.4.2. Il monitoraggio ecografico per la misurazione del diametro follicolare e il numero di follicoli in crescita deve essere parte integrante della terapia con gonadotropine, al fine di ridurre i rischi di gravidanza multipla e di sindrome d iperstimolazione ovarica.

6. Chirurgia tubarica e uterina

6.1. Chirurgia tubarica

6.1.1. In donne con patologia tubarica di modesta gravità, la chirurgia tubarica può risultare efficace. Nei centri con adeguata expertise, la chirurgia tubarica può essere considerata come un'opzione terapeutica.

6.2. Chirurgia per idrosalpingi prima del trattamento di fecondazione in vitro

¹³ Bordewijk EM, Ng KYB, Rakic L, Mol BWJ, Brown J, Crawford TJ, van Wely M. Laparoscopic ovarian drilling for ovulation induction in women with anovulatory polycystic ovary syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Feb 11;2(2):CD001122.

6.2.1. Prima del trattamento di fecondazione in vitro, alle pazienti con idrosalpinge dovrebbe essere suggerito un intervento di salpingectomia, preferibilmente per via laparoscopica, per aumentare le probabilità di successo.

6.3. Chirurgia uterina

6.3.1. Nelle pazienti con amenorrea da sinechie endouterine effettuare un intervento isteroscopico di adesiolisi, in quanto può determinare un ripristino del ciclo mestruale e aumentare le probabilità di gravidanza.

7. Endometriosi

Per quanto attinente al trattamento dell'infertilità associata ad endometriosi si rimanda alle specifiche linee guida dedicate alla malattia.

8. Infertilità inspiegata

8.1. Stimolazione ovarica per il trattamento dell'infertilità inspiegata

8.1.1. Non prescrivere farmaci per la stimolazione ovarica per via orale (clomifene citrato) alle pazienti con infertilità inspiegata.

8.1.2. Informare le pazienti con infertilità inspiegata che la sola stimolazione dell'ovulazione con clomifene citrato non aumenta le probabilità di gravidanza.

8.1.3. Consigliare alle pazienti con infertilità inspiegata che hanno rapporti regolari non protetti di cercare di concepire per almeno 2 anni prima di considerare la fecondazione *in vitro* (incluso un periodo fino ad 1 anno precedente alle indagini per infertilità). Nelle donne di età >35 anni considerare la fecondazione *in vitro* prima dei 2 anni. [Aggiornata 2020]

8.1.4. Prescrivere la fecondazione *in vitro* (cfr. raccomandazione 11.1.3 e 11.1.4) alle pazienti con infertilità inspiegata che non hanno concepito dopo 2 anni di rapporti regolari non protetti (incluso un periodo fino ad 1 anno precedente alle indagini per infertilità). Nelle donne di età >35 anni considerare la fecondazione *in vitro* prima dei 2 anni. [Aggiornata 2020]

9. Inseminazione intrauterina

9.1. Inseminazione intrauterina

9.1.1. Considerare l'inseminazione intrauterina senza stimolazione ovarica come opzione terapeutica alternativa ai rapporti sessuali non protetti nei seguenti gruppi:

- Soggetti che non riescono o hanno difficoltà ad avere rapporti sessuali vaginali completi per disabilità fisiche o problematiche psicosessuali.

- Donazione di seme.
- Soggetti affetti da condizioni che richiedono particolare attenzione riguardo al metodo di concepimento (es. necessità di trattamento per la riduzione della carica virale sul liquido seminale laddove il partner sia HIV positivo).

9.1.2. Per le donne di cui al *punto 9.1.1.* che non abbiano concepito dopo 6 cicli di inseminazione, nonostante un'ovulazione regolare, una dimostrata pervietà tubarica ed un esame del liquido seminale normale, considerare ulteriori 6 cicli di inseminazione intrauterina oppure proporre la fecondazione *in vitro*.

9.1.3. Per i casi di infertilità inspiegata, endometriosi lieve o infertilità da fattore maschile lieve, in coppie con rapporti sessuali regolari non protetti:

- Non prescrivere di routine l'inseminazione intrauterina, con o senza stimolazione ovarica (se non in casi eccezionali come, ad esempio, rifiuto della fecondazione in vitro per motivi sociali, culturali o religiosi)
- Suggestire alla coppia di proseguire la ricerca di una gravidanza mediante rapporti sessuali non protetti per almeno 2 anni prima di considerare la fecondazione in vitro (incluso un periodo fino a 1 anno precedente alle indagini per infertilità). Nelle donne di età >35 anni considerare le tecniche di fecondazione *in vitro* prima dei 2 anni. [Aggiornata 2020]

10. Fattori predittivi di successo della fecondazione in vitro

10.1. Età della donna

10.1.1. Informare le pazienti che le probabilità di avere un figlio con la fecondazione in vitro si riducono progressivamente all'aumentare dell'età della donna (Figura 1).

10.2. Numero di precedenti cicli di trattamento

10.2.1. Informare le pazienti che la probabilità di avere un figlio con la fecondazione in vitro si riduce progressivamente all'aumentare del numero di cicli falliti.

10.3. Precedenti gravidanze

10.3.1. Informare le pazienti del fatto che i trattamenti di fecondazione *in vitro* risultano più efficaci in donne che abbiano già avuto gravidanze e/o figli.

10.4. Indice di massa corporea

10.4.1. Informare le pazienti del fatto che il BMI della donna dovrebbe essere idealmente compreso tra 19 e 29.9 prima di iniziare un percorso di fecondazione assistita e che un BMI al di fuori di questo range

riduce le probabilità di successo del trattamento.

10.5. Stile di vita

10.5.1. Informare i pazienti del fatto che un consumo di alcol >1 unità/die riduce le probabilità di successo della fecondazione *in vitro*.

10.5.2. Informare i pazienti del fatto che il fumo da parte di entrambi i partner può ridurre i tassi di successo della fecondazione *in vitro*.

10.5.3. Informare le pazienti del fatto che l'eccesso di caffeina da parte della donna può ridurre i tassi di successo della fecondazione *in vitro*.

10.5.4. Informare i pazienti che l'attività fisica della donna prima della fecondazione *in vitro* può aumentarne i tassi di successo. [Nuova 2020]¹⁴

11. Criteri di ricorso alla fecondazione *in vitro*

11.1. Criteri di ricorso alla fecondazione *in vitro*

11.1.1. Quando si prende in considerazione la fecondazione *in vitro* discutere con la coppia rischi e benefici, adattandoli alla condizione clinica della coppia. [Aggiornata 2020]

11.1.2. Informare la coppia che normalmente un ciclo completo di fecondazione *in vitro*, con o senza iniezione intracitoplasmatica di spermatozoo (ICSI), comprende un ciclo di stimolazione ovarica e il successivo trasferimento degli embrioni ottenuti (considerando sia quelli trasferiti a fresco che quelli trasferiti dopo crioconservazione).

11.1.3. In donne di età <43 anni, si raccomanda di eseguire fino a 3 cicli completi di fecondazione *in vitro*, con o senza ICSI.

Per le donne tra 40 e 42 anni, raccomandare i cicli solo se sono soddisfatti i seguenti criteri aggiuntivi.

- Non evidenze di riserva ovarica ridotta.
- Discussione approfondita delle implicazioni aggiuntive della fecondazione *in vitro* e della gravidanza a questa età.

Se la donna dovesse compiere 43 anni durante tale programma terapeutico, completare il ciclo in corso ma non eseguirne altri.

11.1.4. In casi selezionati a particolare buona prognosi (come donne giovani che hanno già ottenuto una gravidanza), è possibile procedere con i tentativi oltre quanto esplicitato nella raccomandazione 11.1.3. Tale decisione deve essere però vagliata attentamente e giustificata prestando massima attenzione al rapporto rischi-benefici.

¹⁴ Rao M, Zeng Z, Tang L. Maternal physical activity before IVF/ICSI cycles improves clinical pregnancy rate and live birth rate: a systematic review and meta-analysis. *Reprod Biol Endocrinol*. 2018 Feb 7;16(1):11.

11.1.5. Laddove gli accertamenti dimostrino l'impossibilità di ottenere una gravidanza con una condotta d'attesa e indichino che la fecondazione *in vitro* sia l'unico trattamento efficace, inviare la coppia a un centro di riferimento per eseguire la fecondazione *in vitro*.

11.1.6. Il computo totale dei cicli di fecondazione *in vitro* deve tenere in considerazione sia quelli svolti in regime di Sistema Sanitario Nazionale sia quelli svolti in regime libero-professionale in quanto i limiti riportati sono stati definiti in base ad analisi rischi-benefici per la salute.

11.1.7. Nel valutare l'efficacia e la sicurezza di un nuovo trattamento di fecondazione *in vitro*, considerare anche l'esito dei pregressi trattamenti di fecondazione *in vitro*.

11.1.8. Definire "sospeso" un ciclo di fecondazione *in vitro* in tutti i casi in cui non viene effettuato il prelievo ovocitario. Nel valutare l'idoneità della paziente ad ulteriori cicli di fecondazione *in vitro* tenere in considerazione i precedenti cicli sospesi a seguito di insufficiente risposta alla stimolazione ovarica.

12. Procedure utilizzate nel trattamento di fecondazione *in vitro*

12.1. Procedure utilizzate nel trattamento di fecondazione *in vitro*

12.1.1. Informare le donne che l'impiego di un pre-trattamento (con contraccettivi orali o progestinici) come parte della fecondazione *in vitro* non influenza le probabilità di avere un figlio.

12.1.2. Prendere in considerazione un pre-trattamento (con contraccettivi orali o progestinici) al fine di programmare il ciclo di fecondazione *in vitro*.

12.2. Desensibilizzazione ipofisaria e altri protocolli per evitare il picco prematuro di LH nella fecondazione *in vitro*

12.2.1. Utilizzare protocolli per evitare il picco prematuro di LH nei cicli di fecondazione *in vitro* con stimolazione ovarica mediante gonadotropine.

12.2.2. Nei cicli di fecondazione *in vitro* con stimolazione ovarica mediante gonadotropine utilizzare GnRH agonisti o GnRH antagonisti.

12.2.3. Considerare i GnRH agonisti solo in donne con basso rischio di sindrome da iperstimolazione ovarica.

12.2.4. Quando si utilizzano GnRH agonisti per un trattamento di fecondazione *in vitro*, impiegare un protocollo lungo di desensibilizzazione ipofisaria (long protocol).

12.3 Stimolazione ovarica nella fecondazione *in vitro*

12.3.1. Eseguire la stimolazione ovarica come parte del trattamento di fecondazione *in vitro*.

12.3.2. Utilizzare gonadotropine urinarie o ricombinanti per la stimolazione ovarica.

12.3.3. Quando si utilizzano le gonadotropine per la stimolazione ovarica nel trattamento di fecondazione *in vitro*:

- Considerare un dosaggio di gonadotropine personalizzato, sulla base di fattori predittivi di successo del trattamento, come:
 - Età
 - BMI
 - Presenza di ovaio policistico
 - Riserva ovarica
- Non utilizzare un dosaggio di gonadotropine >300 UI/die. [Aggiornata 2020]¹⁵

12.3.4. Sottoporre le donne a un monitoraggio ecografico (eventualmente associato al dosaggio dei livelli di estradiolo e progesterone) per valutare efficacia e sicurezza durante il ciclo di stimolazione ovarica.

12.3.5. Informare le donne del fatto che i cicli di fecondazione *in vitro* con stimolazione ovarica con gonadotropine presentano tassi di gravidanza superiori rispetto alla fecondazione *in vitro* su cicli naturali.

12.3.6. Considerare la fecondazione *in vitro* su cicli naturali solo in casi attentamente selezionati.

12.3.7. Non utilizzare l'ormone della crescita come trattamento adiuvante nei protocolli di fecondazione *in vitro*. [Aggiornata 2020]¹⁶

12.3.8. Considerare la somministrazione di mio-inositolo prima della fecondazione *in vitro* in quanto riduce la dose totale di gonadotropine impiegate. [Nuova 2020]^{17,18}

12.4. Induzione dell'ovulazione nella fecondazione *in vitro*

12.4.1. Prescrivere alle donne la gonadotropina corionica umana (urinaria o ricombinante) per indurre l'ovulazione nel trattamento di fecondazione *in vitro*.

12.4.2. Considerare il trigger con GnRH agonista nei pazienti a rischio di Sindrome da Iperstimolazione ovarica. [Nuova 2020]¹⁹

12.4.3. Eseguire il monitoraggio ecografico della risposta ovarica come parte integrante dei cicli di trattamento di fecondazione *in vitro*.

¹⁵ Lensen SF, Wilkinson J, Leijdekkers JA, La Marca A, Mol BWJ, Marjoribanks J, Torrance H, Broekmans FJ. Individualised gonadotropin dose selection using markers of ovarian reserve for women undergoing in vitro fertilisation plus intracytoplasmic sperm injection (IVF/ICSI). *Cochrane Database Syst Rev*. 2018 Feb 1;2(2):CD012693.

¹⁶ Liu Y, Hu L, Fan L, Wang F. Efficacy of dehydroepiandrosterone (DHEA) supplementation for in vitro fertilization and embryo transfer cycles: a systematic review and meta-analysis. *Gynecol Endocrinol*. 2018 Mar;34(3):178-183.

¹⁷ Laganà AS, Vitagliano A, Noventa M, Ambrosini G, D'Anna R. Myo-inositol supplementation reduces the amount of gonadotropins and length of ovarian stimulation in women undergoing IVF: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Arch Gynecol Obstet*. 2018 Oct;298(4):675-684.

¹⁸ Zheng X, Lin D, Zhang Y, Lin Y, Song J, Li S, Sun Y. Inositol supplement improves clinical pregnancy rate in infertile women undergoing ovulation induction for ICSI or IVF-ET. *Medicine (Baltimore)*. 2017 Dec;96(49):e8842.

¹⁹ Mizrahi Y, Horowitz E, Farhi J, Raziel A, Weissman A. Ovarian stimulation for freeze-all IVF cycles: a systematic review. *Hum Reprod Update*. 2020 Jan 1;26(1):118-135.

12.4.4. I centri che utilizzano gonadotropine per la stimolazione ovarica devono disporre di protocolli per la prevenzione, diagnosi e gestione della sindrome da iperstimolazione ovarica.

12.4.5. Considerare l'impiego di Agonisti della Dopamina per prevenire la sindrome da iperstimolazione ovarica in pazienti a rischio. [Nuova 2020]²⁰

12.5. Prelievo ovocitario e raccolta del seme nella fecondazione *in vitro*

12.5.1. Nel corso di un prelievo ovocitario, impiegare modalità efficaci di contenimento del dolore.

12.5.2. Per una somministrazione sicura dei farmaci sedativi fare riferimento alle specifiche linee guida anestesiológicas.

12.5.3. Non eseguire il lavaggio della cavità follicolare, perché non aumenta il numero di ovociti prelevati o i tassi di gravidanza, mentre si associa ad una maggiore durata del prelievo e del dolore. [Aggiornata 2020]²¹

12.5.4. La raccolta degli spermatozoi per via chirurgica prima di una ICSI può essere eseguita secondo diverse tecniche, in base alla patologia e alle preferenze del paziente. In tutti i casi, garantire la disponibilità di strutture per la crioconservazione degli spermatozoi.

12.5.5. L'*assisted hatching* su embrioni ottenuti da ciclo a fresco non è raccomandato in quanto non vi sono evidenze che aumenti i tassi di gravidanza. Le evidenze su materiale crioconservato sono ancora insufficienti. [Aggiornata 2020]²²

12.6. Strategie di trasferimento embrionario nella fecondazione *in vitro*

12.6.1. Nelle donne che si sottopongono a trattamenti di fecondazione *in vitro* eseguire il trasferimento embrionario eco-assistito perché aumenta i tassi di gravidanza.

12.6.2. Il trasferimento embrionario in presenza di uno spessore endometriale <5 mm difficilmente esita in una gravidanza e pertanto non è raccomandato.

12.6.3. Informare le donne che il riposo a letto per più di 20 minuti dopo il trasferimento embrionario non migliora l'esito del trattamento di fecondazione *in vitro*.

12.6.4. Utilizzare le raccomandazioni dell'ESHRE per valutare lo stato di sviluppo degli embrioni, sia allo stadio di clivaggio che a quello di blastocisti. [Aggiornata 2020]²³

12.6.5. Nel valutare il numero di embrioni freschi o crioconservati da trasferire, seguire le seguenti indicazioni:

²⁰ Tang H, Mourad S, Zhai SD, Hart RJ. Dopamine agonists for preventing ovarian hyperstimulation syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Nov 30;11(11):CD008605. doi: 10.1002/14651858.CD008605.

²¹ Georgiou EX, Melo P, Brown J, Granne IE. Follicular flushing during oocyte retrieval in assisted reproductive techniques. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Apr 26;4(4):CD004634. doi: 10.1002/14651858.CD004634.

²² Zeng M, Su S, Li L. The effect of laser-assisted hatching on pregnancy outcomes of cryopreserved-thawed embryo transfer: a meta-analysis of randomized controlled trials. Lasers Med Sci. 2018 Apr;33(3):655-666.

²³ ESHRE Special Interest Group of Embryology and Alpha Scientists in Reproductive Medicine. The Vienna consensus: report of an expert meeting on the development of ART laboratory performance indicators. Reprod Biomed Online. 2017 Nov;35(5):494-510.

- Per donne di età <37 anni:
 - Nel primo ciclo completo di fecondazione *in vitro* trasferire un singolo embrione.
 - Nel secondo ciclo completo di fecondazione *in vitro* se si dispone di 1 o più embrioni di ottima qualità morfologica trasferire un singolo embrione. Considerare il trasferimento di 2 embrioni se non sono disponibili embrioni di ottima qualità morfologica.
 - Nel terzo ciclo completo di fecondazione *in vitro* trasferire non più di 2 embrioni.
- Per donne di età compresa tra 37 e 39 anni:
 - Nel primo e secondo ciclo completo di fecondazione *in vitro* se si dispone di 1 o più embrioni di ottima qualità morfologica trasferire un singolo embrione. Considerare il trasferimento di 2 embrioni se non sono disponibili embrioni di ottima qualità morfologica.
 - Nel terzo ciclo completo di fecondazione *in vitro* trasferire non più di 2 embrioni.
- Per donne di età compresa tra i 40 e 42 anni considerare il trasferimento di 2 embrioni.

12.6.6. Per le donne che si sottopongono ad un trattamento di fecondazione *in vitro* con ovociti da donatrice, scegliere la strategia di trasferimento embrionario come riportato alla *raccomandazione 12.6.5.* per le donne di età < 37 anni. Prestare attenzione nella scelta anche alla salute generale della ricevente e ai suoi possibili rischi ostetrici.

12.6.7. Non trasferire più di 2 embrioni in nessun ciclo di fecondazione *in vitro*.

12.6.8. Se è disponibile una blastocisti di ottima qualità morfologica, trasferire un solo embrione.

12.6.9. Quando si prende in considerazione il trasferimento di 2 embrioni, informare le coppie dell'associato rischio di gravidanza multipla.

12.6.10. Informare le donne che il trasferimento di un solo embrione non protegge in assoluto contro la gravidanza gemellare: la fecondazione *in vitro* si associa a un rischio 2-3 volte superiore di gravidanza monozigote. [Nuova 2020]^{24,25}

12.6.11. Informare le donne che la fecondazione *in vitro* si associa ad un rischio aumentato di placentazione anomala (placenta previa, distacco di placenta, inserzioni anomale del funicolo). [Nuova 2020]²⁶

12.6.12. Garantire la criopreservazione degli embrioni non trasferiti.

12.6.13. Informare le donne con cicli ovulatori regolari che le probabilità di gravidanza dopo il trasferimento di un embrione criopreservato e scongelato sono simili per embrioni trasferiti su un ciclo spontaneo o su un ciclo da terapia ormonale sostitutiva.

²⁴ Busnelli A, Dallagiovanna C, Reschini M, Paffoni A, Fedele L, Somigliana E. Risk factors for monozygotic twinning after in vitro fertilization: a systematic review and meta-analysis. *Fertil Steril*. 2019 Feb;111(2):302-317.

²⁵ Hviid KVR, Malchau SS, Pinborg A, Nielsen HS. Determinants of monozygotic twinning in ART: a systematic review and a meta-analysis. *Hum Reprod Update*. 2018 Jul 1;24(4):468-483.

²⁶ Vermey BG, Buchanan A, Chambers GM, Kolibianakis EM, Bosdou J, Chapman MG, Venetis CA. Are singleton pregnancies after assisted reproduction technology (ART) associated with a higher risk of placental anomalies compared with non-ART singleton pregnancies? A systematic review and meta-analysis. *BJOG*. 2019 Jan;126(2):209-218.

12.6.14. Informare le donne della possibilità di effettuare la diagnosi preimpianto per l'identificazione di aneuploidie embrionali ma che questa tecnica non può aumentare le probabilità di gravidanza. [Nuova 2020]^{27,28,29}

12.7. Supporto della fase luteale dopo fecondazione *in vitro*

12.7.1. Prescrivere alle donne progesterone per il supporto della fase luteale dopo un trattamento di fecondazione *in vitro*.

12.7.2. Non prescrivere di routine la gonadotropina corionica umana per il supporto della fase luteale dopo un trattamento di fecondazione *in vitro* in quanto aumenta il rischio di sindrome da iperstimolazione ovarica.

12.7.3. Informare le donne che si stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione *in vitro* che non vi sono evidenze che giustifichino il proseguimento del supporto della fase luteale oltre le 5 settimane di gestazione. [Aggiornata 2020]³⁰

12.8. Trasferimento intratubarico di gameti e trasferimento intratubarico di zigoti

12.8.1. Non vi sono sufficienti evidenze per raccomandare il trasferimento intratubarico di gameti o di zigoti rispetto al trasferimento intrauterino di embrioni.

13. Iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI)

13.1. Indicazioni per la ICSI

13.1.1. Le indicazioni riconosciute per l'uso della ICSI sono:

- Fattore maschile grave (alterazioni severe della qualità del liquido seminale).
- Azoospermia ostruttiva.
- Azoospermia non ostruttiva.
- Utilizzo di ovociti crioconservati.

In aggiunta, considerare la ICSI in coppie in cui in un precedente ciclo di trattamento con fecondazione *in vitro* classica non sia stata osservata fecondazione o il tasso di fecondazione sia stato molto basso.

²⁷ Lee E, Illingworth P, Wilton L, Chambers GM. The clinical effectiveness of preimplantation genetic diagnosis for aneuploidy in all 24 chromosomes (PGD-A): systematic review. Hum Reprod. 2015 Feb;30(2):473-83.

²⁸ Munné S, Kaplan B, Frattarelli JL, Child T, Nakhuda G, Shamma FN, Silverberg K, Kalista T, Handyside AH, Katz-Jaffe M, Wells D, Gordon T, Stock-Myer S, Willman S; STAR Study Group. Preimplantation genetic testing for aneuploidy versus morphology as selection criteria for single frozen-thawed embryo transfer in good-prognosis patients: a multicenter randomized clinical trial. Fertil Steril. 2019 Dec;112(6):1071-1079.

²⁹ Cornelisse S, Zagers M, Kostova E, Fleischer K, van Wely M, Mastenbroek S. Preimplantation genetic testing for aneuploidies (abnormal number of chromosomes) in in vitro fertilisation. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Sep 8;9:CD005291.

³⁰ Watters M, Noble M, Child T, Nelson S. Short versus extended progesterone supplementation for luteal phase support in fresh IVF cycles: a systematic review and meta-analysis. Reprod Biomed Online. 2020 Jan;40(1):143-150.

13.2. Aspetti genetici e consulenza

13.2.1. Prima del trattamento con ICSI per fattore maschile severo, sottoporre le coppie ad indagini appropriate sia a scopo diagnostico sia per consentire una discussione informata sulle implicazioni del trattamento.

13.2.2. Prima del trattamento con ICSI, considerare i possibili risvolti genetici.

13.2.3. Nei casi in cui è noto o sospetto un difetto genetico specifico associato con infertilità maschile, fornire alla coppia un'adeguata consulenza genetica ed idonei accertamenti genetici.

13.2.4. Nei casi in cui l'indicazione alla ICSI è un fattore maschile grave o un'azoospermia non ostruttiva, valutare il cariotipo del partner maschile.

13.2.5. Ai soggetti che si sottopongono ad indagine del cariotipo, fornire una consulenza genetica sulle anomalie che potrebbero essere riscontrate.

13.2.6. Non considerare la ricerca delle microdelezioni del cromosoma Y come indagine di *routine* prima della ICSI. Tuttavia, informare le coppie che una percentuale significativa dell'infertilità maschile deriva verosimilmente da anomalie di geni situati sul cromosoma Y, coinvolti nella regolazione della spermatogenesi.

13.3. ICSI *versus* fecondazione *in vitro* classica

13.3.1. Informare le coppie del fatto che con la ICSI il tasso di fecondazione potrebbe essere superiore a quello della fecondazione *in vitro* classica ma che a fecondazione avvenuta, il tasso di gravidanze non è superiore.

14. Indicazioni all'inseminazione da donatore

14.1. Indicazioni all'inseminazione da donatore

14.1.1. Eseguire l'inseminazione con spermatozoi da donatore nel caso in cui non siano disponibili gameti competenti anche dopo tentativi di recupero di spermatozoi (con tecniche chirurgiche o mediche). Se la coppia non vuole esporsi ai rischi delle procedure di recupero o a quelli della fecondazione *in vitro* con ICSI, proporre l'inseminazione con spermatozoi da donatore.

14.1.2. Considerare l'inseminazione con spermatozoi da donatore anche nelle seguenti condizioni:

- rischio elevato di trasmettere una malattia genetica alla prole.
- rischio elevato di trasmettere una malattia infettiva alla prole o alla partner.
- isoimmunizzazione Rh severa.

14.2. Informazione

14.2.1. Informare le coppie con fattore maschile severo in merito ai rischi e ai benefici sia della ICSI

omologa che della donazione.

14.2.2. Alle coppie che prendono in considerazione l'inseminazione con spermatozoi da donatore, offrire una consulenza sulle implicazioni mediche, genetiche e psicologiche del trattamento per la coppia stessa e per la prole.

14.3. Reclutamento

14.3.1. I Centri di medicina della riproduzione attivi nel reclutamento di donatori e nella crioconservazione di liquido seminale devono attenersi alle norme riportate dal D. Lgs. 16/2010 e successive integrazioni (compreso D. Lgs. 85/2012 e DPR 131/2019).

14.3.2. Offrire a tutti i potenziali donatori di spermatozoi una consulenza in merito alle implicazioni del trattamento per loro stessi (comprese quelle di carattere giuridico e psicologico).

14.4. Trattamento

14.4.1. Prima di iniziare trattamenti con spermatozoi da donatore è importante:

- avere conferma di cicli ovulatori nella donna.
- eseguire test diagnostici mirati a valutare la pervietà tubarica in caso di storia suggestiva di danno tubarico.

14.4.2. In donne prive di fattori di rischio, non è essenziale eseguire i test di valutazione della pervietà tubarica. Considerare questi test dopo 3 cicli falliti.

14.4.3. In caso di utilizzo di spermatozoi di donatore preferire l'inseminazione intrauterina a quella cervicale poiché si associa a tassi di gravidanza più elevati.

14.4.4. Offrire fino a 6 cicli di inseminazione senza stimolazione ovarica al fine di ridurre il rischio di gemellarità.

15. Donazione di ovociti

15.1. Indicazioni alla donazione di ovociti

15.1.1. L'uso di ovociti da donatrice è indicato nelle seguenti condizioni:

- Menopausa precoce
- Disgenesie gonadiche come la Sindrome di Turner
- Ovariectomia bilaterale

- Menopausa a seguito di radio o chemioterapia
- Ripetuti fallimenti di cicli di fecondazione *in vitro* omologhi
- Non disponibilità di gameti competenti (come età avanzata)

Inoltre, la procedura può essere presa in considerazione in caso di elevato rischio di trasmissione di malattie genetiche alla prole.

15.2. Screening delle donatrici

15.2.1. I Centri di medicina della riproduzione attivi nel reclutamento di donatrici e nella crioconservazione di ovociti devono attenersi alle disposizioni riportate dal D. Lgs. 16/2010 e successive integrazioni (compreso D. Lgs. 85/2012 e DPR 131/2019).

15.3. Donazione di ovociti e egg sharing

15.3.1. Informare le donatrici di ovociti in merito ai rischi della stimolazione ovarica e del prelievo ovocitario.

15.3.2. Garantire alle donatrici e alle riceventi una consulenza sulle implicazioni a breve e lungo termine del trattamento, in ambito giuridico, medico, genetico e psicologico.

15.3.3. Offrire una consulenza specifica a tutte le coppie che considerano un programma di egg-sharing.

15.3.4. Le donne che si sottopongono a ovodonazione devono essere informate degli aumentati rischi ostetrici ed in particolare dei rischi di parto prematuro, disturbi pressori in gravidanza e di avere neonati di basso peso. La consulenza deve essere personalizzata sulla base dello specifico quadro clinico della paziente. [Nuovo 2020]^{31,32,33}

16. Pazienti oncologici che desiderano preservare la loro fertilità

16.1.1. Nei pazienti in procinto di iniziare trattamenti chemioterapici o radioterapici che possono ridurre la fertilità, considerare la crioconservazione secondo le raccomandazioni dell'AIOM sul SNLG.

³¹ Mascarenhas M, Sunkara SK, Antonisamy B, Kamath MS. Higher risk of preterm birth and low birth weight following oocyte donation: A systematic review and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017 Nov;218:60-67.

³² Jevé YB, Potdar N, Opoku A, Khare M. Donor oocyte conception and pregnancy complications: a systematic review and meta-analysis. BJOG. 2016 Aug;123(9):1471-80.

³³ Masoudian P, Nasr A, de Nanassy J, Fung-Kee-Fung K, Bainbridge SA, El Demellawy D. Oocyte donation pregnancies and the risk of preeclampsia or gestational hypertension: a systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol. 2016 Mar;214(3):328-39

- 16.1.2. Al momento della diagnosi di tumore, il team oncologico deve discutere con il/la paziente l'impatto della malattia e del trattamento sulla fertilità futura.
- 16.1.3. Nella decisione di eseguire o meno tecniche di preservazione della fertilità tenere conto dei seguenti fattori:
- età;
 - diagnosi oncologica;
 - piano terapeutico;
 - risultati attesi dai trattamenti di preservazione della fertilità;
 - prognosi del trattamento oncologico;
 - impatto dei processi di congelamento, mantenimento in biobanca e scongelamento sul materiale crioconservato;
 - riserva ovarica (per la donna).
- 16.1.4. Considerare l'impiego di strumenti di informazione e di supporto decisionale (cartacei, video o online) perché incoraggiano la partecipazione attiva dei pazienti nelle decisioni cliniche e rendono più consapevole la loro scelta. [Nuova 2020]³⁴
- 16.1.5. Per la preservazione della fertilità in pazienti oncologici, non utilizzare gli stessi criteri di accesso adottati per i convenzionali trattamenti per l'infertilità.
- 16.1.6. Non applicare un limite inferiore di età per la crioconservazione a scopo di preservazione della fertilità in pazienti oncologici.
- 16.1.7. Informare i pazienti oncologici che le norme sui criteri di accesso per i trattamenti dell'infertilità non sono applicabili per la preservazione della fertilità. Tuttavia, queste stesse norme verranno applicate quando sarà utilizzato il materiale crioconservato.
- 16.1.8. Quando si decide di preservare la fertilità in pazienti oncologici, crioconservare liquido seminale o ovociti o tessuto ovarico.
- 16.1.9. Proporre la crioconservazione del liquido seminale a uomini e adolescenti che stanno per essere sottoposti ad una terapia oncologica che probabilmente li renderà infertili.
- 16.1.10. Crioconservare il liquido seminale in azoto liquido.
- 16.1.11. Proporre la crioconservazione ovocitaria a donne in età riproduttiva (comprese le adolescenti) che stanno per essere sottoposte a trattamenti oncologici gonadotossici se:
- il loro stato di salute generale è tale da consentire loro di sottoporsi alla stimolazione ovarica controllata e al recupero ovocitario e
 - tali procedure non determineranno un peggioramento del loro stato di salute e
 - vi è sufficiente tempo prima delle terapie oncologiche
 - hanno una riserva ovarica sufficiente.

³⁴ Wang Y, Anazodo A, Logan S. Systematic review of fertility preservation patient decision aids for cancer patients. *Psychooncology*. 2019 Mar;28(3):459-467.

16.1.12. Proporre la crioconservazione di tessuto ovarico in pazienti prepuberi o in giovane età che stanno per essere sottoposte a trattamenti oncologici gonadotossici se:

- il loro stato di salute generale è tale da consentire loro di sottoporsi a un intervento chirurgico e
- tali procedure non determineranno un peggioramento del loro stato di salute e
- vi è sufficiente tempo prima delle terapie oncologiche. [Nuova 2020]

16.1.13. Come tecnica di crioconservazione degli ovociti, preferire la vitrificazione al congelamento lento quando attrezzature e competenze sono disponibili.

16.1.14. Includere nel consenso informato la durata e le modalità di rinnovo della crioconservazione dei gameti. [Aggiornata 2020]

17. Sicurezza a lungo termine delle tecniche di riproduzione medicalmente assistita

ella stimolazione ovarica

17.1.1. Fornire alle donne che stanno prend

17.1. **Effetti a lungo termine** d'endo in considerazione l'induzione dell'ovulazione o la stimolazione ovarica informazioni aggiornate in merito agli effetti a lungo termine di tale trattamento sulla salute.

17.1.2. Informare le coppie a cui sono state proposte l'induzione dell'ovulazione o la stimolazione ovarica che:

- non è stata dimostrata alcuna associazione diretta tra questi trattamenti e l'insorgenza di neoplasie maligne.
- non è stata dimostrata associazione nel breve e medio termine tra questi trattamenti ed effetti avversi nei bambini nati (inclusa l'insorgenza di neoplasie maligne).
- non sono ancora disponibili informazioni in merito agli effetti a lungo termine sulla salute delle donne trattate e su quella dei bambini nati.

17.1.3. Limitare l'uso dei farmaci per l'induzione dell'ovulazione e per la stimolazione ovarica alla minima dose efficace e alla minima durata di utilizzo.

17.2. Effetti a lungo termine e sicurezza della fecondazione *in vitro*

17.2.1. Fornire ai soggetti che stanno prendendo in considerazione un trattamento di fecondazione *in vitro*, con o senza ICSI, informazioni aggiornate in merito agli effetti a lungo termine di tali trattamenti sulla salute (inclusi i rischi legati a gravidanze multiple).

17.2.2. Informare i soggetti che stanno prendendo in considerazione un trattamento di fecondazione *in vitro*, con o senza ICSI che, mentre il rischio assoluto di effetti avversi a lungo termine è basso, non si può escludere un minimo aumento del rischio di tumori borderline dell'ovaio.

17.2.3. Ancorché siano eventi molto rari, informare i soggetti che stanno prendendo in considerazione un trattamento di fecondazione *in vitro*, con o senza ICSI, che i bambini nati sono ad aumentato rischio

di malattie epigenetiche da difetti dell'imprinting. [Nuova 2020]³⁵

17.2.4. Informare i soggetti che stanno prendendo in considerazione un trattamento di fecondazione *in vitro*, con o senza ICSI, che i bambini nati hanno un modesto aumento del rischio di malformazioni rispetto alla popolazione generale. Non ci sono tuttavia evidenze che sia la tecnica e non la condizione di infertilità a determinare il rischio. [Aggiornata 2020]^{36,37,38,39}

³⁵ Cortessis VK, Azadian M, Buxbaum J, Sanogo F, Song AY, Sriprasert I, Wei PC, Yu J, Chung K, Siegmund KD. Comprehensive meta-analysis reveals association between multiple imprinting disorders and conception by assisted reproductive technology. J Assist Reprod Genet. 2018 Jun;35(6):943-952.

³⁶ Chen L, Yang T, Zheng Z, Yu H, Wang H, Qin J. Birth prevalence of congenital malformations in singleton pregnancies resulting from in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection worldwide: a systematic review and meta-analysis. Arch Gynecol Obstet. 2018 May;297(5):1115-1130.

³⁷ Liang Y, Chen L, Yu H, Wang H, Li Q, Yu R, Qin J. Which type of congenital malformations is significantly increased in singleton pregnancies following after *in vitro* fertilization/intracytoplasmic sperm injection: a systematic review and meta-analysis. Oncotarget. 2017 Dec 25;9(3):4267-4278.

³⁸ Hoorsan H, Mirmiran P, Chaichian S, Moradi Y, Hoorsan R, Jesmi F. Congenital Malformations in Infants of Mothers Undergoing Assisted Reproductive Technologies: A Systematic Review and Meta-analysis Study. J Prev Med Public Health. 2017 Nov;50(6):347-360.

³⁹ Giorgione V, Parazzini F, Fesslova V, Cipriani S, Candiani M, Inversetti A, Sigismondi C, Tiberio F, Cavoretto P. Congenital heart defects in IVF/ICSI pregnancy: systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2018 Jan;51(1):33-42.

